

اتصال دالة عدديه

1) اتصال دالة في نقطة :

أ. تعریف :

لتکن f دالة عدديه معرفة على مجال مفتوح مركزه x_0
نقول أن f متصلة في x_0 إذا كان $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists \alpha \in \mathbb{R})(\forall x \in D_f) : 0 < |x - x_0| < \alpha \Rightarrow |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$$

معنى x_0 متصلة في f

$\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x > a}} f(x) = f(a) \Leftrightarrow f$ متصلة في a على اليمين ✓

$\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x < a}} f(x) = f(a) \Leftrightarrow f$ متصلة في a على اليسار ✓

$\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x > a}} f(x) = \lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x < a}} f(x) = f(a) \Leftrightarrow f$ متصلة في a ✓

ب. التمديد بالاتصال في نقطة :

لتکن f دالة عدديه بحيث $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$ و $x_0 \notin D_f$
الدالة \tilde{f} بحيث :
$$\begin{cases} \tilde{f}(x) = f(x) & x \neq x_0 \\ \tilde{f}(x_0) = l \end{cases}$$

الدالة \tilde{f} تسمى التمديد بالاتصال للدالة f في x_0

2) الاتصال على مجال :

أ. تعاریف :

- f متصلة على مجال $[a, b]$ يعني f متصلة في جميع عناصر المجال $[a, b]$
- f متصلة على مجال $[a, b]$ يعني f متصلة في جميع عناصر المجال $[a, b]$ و متصلة على يمين a و متصلة على يسار b

- f متصلة على مجال $[a,b]$ يعني f متصلة في جميع عناصر المجال $[a,b]$ ومتصلة على يمين a
- f متصلة على مجال $[a,b]$ يعني f متصلة في جميع عناصر المجال $[a,b]$ ومتصلة على يسار b

بـ. العمليات على الدوال المتصلة :

- ❖ الدوال الحدوية متصلة على \mathbb{R}
- ❖ الدوال الجذرية متصلة على كل مجال ضمن مجموعة تعريفها
- ❖ الدوال المثلثية \sin و \cos متصلتان على \mathbb{R}
- ❖ دالة \tan متصلة على كل مجال ضمن مجموعة تعريفها
- ❖ دالة الجزء الصحيح متصلة على كل مجال $(n \in \mathbb{Z})$ $[n, n+1]$
- ❖ إذا كانت f و g متصلتان على مجال I فإن $f+g$ و $f \times g$ متصلتان على I
- ❖ إذا كانت f و g متصلتان على مجال I و $0 \neq g$ على I فإن $\frac{f}{g}$ متصلة على I .
- ❖ إذا كانت f متصلة على مجال I و $f \geq 0$ على I فإن \sqrt{f} متصلة على I .

خاصية :

1. إذا كانت f متصلة على مجال I و g متصلة على J بحيث $f(I) \subset J$ فإن $g \circ f$ متصلة على I

2. إذا كانت f متصلة في x_0 و g متصلة في $f(x_0)$ فإن $g \circ f$ متصلة في x_0

(3) صورة مجال بدالة متصلة:

خاصية :

- صورة قطعة بدالة متصلة هي قطعة
- صورة مجال بدالة متصلة هو مجال

صورة مجال بدالة متصلة و رتبة قطعا : 4

$f(I)$	المجال I	
$[f(a), f(b)]$	$[a, b]$	
$\left[f(a), \lim_{\substack{x \rightarrow b \\ x < b}} f(x) \right[$	$[a, b[$	
$\left] \lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x > a}} f(x), f(b) \right]$	$]a, b]$	
$\left[\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x > a}} f(x), \lim_{\substack{x \rightarrow b \\ x < b}} f(x) \right[$	$]a, b[$	f تزايدية قطعا
$\left] \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x), f(a) \right]$	$] -\infty, a]$	
$\left] \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x), \lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x < a}} f(x) \right[$	$] -\infty, a[$	
$\left[f(b), \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \right[$	$[b, +\infty[$	
$\left[\lim_{\substack{x \rightarrow b \\ x > b}} f(x), \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \right[$	$]b, +\infty[$	
$\left] \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x), \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \right[$	$] -\infty, +\infty[$	
$[f(b), f(a)]$	$[a, b]$	
$\left[\lim_{\substack{x \rightarrow b \\ x < b}} f(x), f(a) \right]$	$[a, b[$	
$\left[f(b), \lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x > a}} f(x) \right]$	$]a, b]$	
$\left] \lim_{\substack{x \rightarrow b \\ x < b}} f(x), \lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x > a}} f(x) \right[$	$]a, b[$	
$\left[f(a), \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) \right]$	$] -\infty, a]$	f تناقصية قطعا
$\left[\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x > a}} f(x), \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) \right[$	$] -\infty, a[$	
$\left] \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x), f(b) \right]$	$[b, +\infty[$	
$\left[\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x), \lim_{\substack{x \rightarrow b \\ x > b}} f(x) \right[$	$]b, +\infty[$	
$\left] \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x), \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) \right[$	$] -\infty, +\infty[$	

5) مبرهنة القيم الوسيطية :

إذا كانت f متصلة على $[a;b]$ فإنه لكل λ محصور بين (a) و (b) يوجد على الأقل c من $[a;b]$ بحيث :

نتائج :

▪ مبرهنة القيم الوسيطية (وجودية الحل على $[a,b]$)

إذا كانت f متصلة على $[a,b]$ و $f(a) \times f(b) < 0$ فإن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلا على الأقل في المجال $[a,b]$

▪ مبرهنة القيم الوسيطية بالوحدانية (وجودية ووحدانية الحل على $[a,b]$)

إذا كانت f متصلة و رتبة قطعا على $[a,b]$ و $f(a) \times f(b) < 0$ فإن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا في المجال $[a,b]$

▪ مبرهنة (وجودية ووحدانية الحل على مجال I)

إذا كانت f متصلة و رتبة قطعا على I و $0 \in f(I)$ فإن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا في المجال I

6) الدالة العكسية :

خاصية :

إذا كانت f دالة متصلة و رتبة قطعا على مجال I فإن f^{-1} تقبل دالة عكسية معرفة من مجال $(I) = f(J)$ نحو I
أو نقول أن f^{-1} تقابل من I نحو J و تقابلها العكسي

نتائج :

$$(1) \quad \begin{cases} y = f^{-1}(x) \\ x \in J \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} f(y) = x \\ y \in I \end{cases}$$

$$(2) \quad \begin{cases} f^{-1} \circ f(x) = x \\ f \circ f^{-1}(x) = x \end{cases}; x \in I$$

خاصيات:

لتكن f دالة و f^{-1} دالتها العكسيّة على المجال J لدينا :

+ متعلقة على المجال J 
و f^{-1} لهما نفس الرتابة 
منحنى f^{-1} هو مماثل لمنحنى f بالنسبة لمستقيم ذي المعادلة $y = x$ (المنصف الأول للمعلم) 

