



I. النهايات (تذكير)

نشاط 1 :

(1) ذكر بتعريف : $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \ell$ (2) ذكر بتعريف التالية : أ - $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ ب - $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \ell$ ج - $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \ell_g$

(3) ذكر بالأشكال الغير المحددة .

(4) ذكر بعض خاصيات النهايات و الترتيب .

جواب :

(1) ذكر بتعريف : $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \ell$

1. تعريف 1 :

دالة معرفة بجوار x_0 . أي $[x_0 - r, x_0 + r] \subset D_f$ مع $r > 0$.نقول إن $f(x)$ يؤول إلى العدد الحقيقي ℓ عندما يقول x إلى a لمعنى أن $f(x) - \ell \rightarrow 0$ عندما يقول x إلى a .أو أيضاً : $\forall \epsilon > 0, \exists \alpha > 0, 0 < |x - x_0| < \alpha \Rightarrow |f(x) - \ell| < \epsilon$.نرمز لذلك بـ $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \ell$.

(2) ذكر بالتعريف التالية :

أ - تعريف L : $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \ell_g$

2. تعريف 2 :

دالة عدديّة معرفة على يسار x_0 . أي $[x_0 - r, x_0] \subset D_f$ مع $r > 0$.نقول إن $f(x)$ يؤول إلى العدد الحقيقي ℓ_g عندما يقول x إلى a على اليسار لمعنى أن $\forall \epsilon > 0, \exists \alpha > 0, 0 < x_0 - x < \alpha \Rightarrow |f(x) - \ell_g| < \epsilon$.نرمز لذلك بـ $\lim_{\substack{x \rightarrow x \\ x < x_0}} f(x) = \ell_g$ أو أيضاً $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \ell_g$.ب - تعريف L : $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \ell$ 3. تعريف 3: $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \ell$ دالة معرفة بجوار $-\infty$. أي $(-\infty, b] \subset D_f$ نقول إن $f(x)$ يؤول إلى العدد الحقيقي ℓ عندما يقول x إلى $+\infty$ لمعنى أن $|f(x) - \ell| < \epsilon$.نرمز لذلك بـ $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \ell$.ج - تعريف L : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ 4. تعريف 4: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ دالة معرفة بجوار $+\infty$. أي $[b, +\infty[\subset D_f$ نقول إن $f(x)$ تؤول إلى $+\infty$ عندما يقول x إلى $+\infty$ لمعنى أن $f(x) > A$.نرمز لذلك بـ $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.



(3) الأشكال الغير المحددة هي :

$$\bullet \quad 0^0 \quad (5) \quad \frac{0}{0} \quad (\text{4}) \quad \frac{\pm\infty}{\pm\infty} \quad (3) \quad 0 \times (\pm\infty) \quad (2) \quad (-\infty) + (+\infty); \quad (+\infty) + (-\infty) \quad (1)$$

(4) نذكر بعض خاصيات النهايات و الترتيب .


f و g و h دوال عددية حيث :

- إذا كان $\lim_{x \rightarrow ?} g(x) = +\infty$ فإن $\lim_{x \rightarrow ?} f(x) = +\infty$ و $f(x) \leq g(x)$
- إذا كان $\lim_{x \rightarrow ?} f(x) = -\infty$ و $\lim_{x \rightarrow ?} g(x) = -\infty$ فإن $f(x) \leq g(x)$
- إذا كان $\lim_{x \rightarrow ?} h(x) = \ell$ فإن $\lim_{x \rightarrow ?} f(x) = \lim_{x \rightarrow ?} g(x) = \ell$ و $f(x) \leq h(x) \leq g(x)$

نشاط 2 :

1. تمرين 5 :

الرسم التالي يمثل منحنى دالة f .

أ. حدد مبانيها D_f مجموعة تعريف الدالة f .ب. استنتج مبانيها نهایات f عند محدودات D_f وكذلك في 1 .

2. تمرين 1 :

أحسب النهايات التالية : $\lim_{x \rightarrow +\infty} 2x - \sqrt{4x^2 - 8x}$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x-1}{|4-2x|}$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} x + |x+2|$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} (-2x^5 + 1)^3 (3x+2)$

3. تمرين 2 :

حدد a علما أن f لها نهاية في 3 حيث f معرفة كما يلي:

$$\begin{cases} f(x) = \frac{x-3}{2-\sqrt{x+1}} & ; x > 3 \\ f(x) = \frac{a}{x-1} & ; x \leq 3 \end{cases}$$

4. تمرين 3 :

أحسب : $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2 + \cos x}{1+x^2}$ و $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sin \pi x}{x-1}$

5. تمرين 4 :







لتكن f الدالة العددية المعرفة بما يلي : $f(x) = \frac{\sqrt{x}}{1-|x-1|}$ أ. حدد D_f مجموعة تعريف الدالة f .ب. أحسب نهایات f عند محدودات D_f .II. اتصال دالة عددية في نقطة x_0 :

01. نشاط 1 :

المنحنيات التالية تمثل الدوال f مع $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\} \in i$. نأخذ النقطة التي أقصولها 1 . $x_0 = 1$



- (1) نأخذ النقطة التي أقصولها $x_0 = 1$ ماذا تلاحظ ؟
- (2) استنتاج مبيانيا ($\lim_{x \rightarrow 1} f_i(x)$) مع $i \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$
- (3) الرسم 1 و 7 يمثلان دالتين متصلتين في النقطة $x_0 = 1$ و في الحالات الأخرى غير متصلة في النقطة $x_0 = 1$.
- (4) أعط تعريف لاتصال دالة في نقطة x_0 .



تعريف 02 :

دالة عدديّة يحتوي حيز تعرّيفها على مجال مفتوح I و x_0 من I .
 f متصلاً في x_0 يكافيء : $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$

تعريف 03 :

دالة عدديّة معرفة على مجال مفتوح I و x_0 من I .
 f متصلاً في x_0 يكافيء : $\forall \varepsilon > 0, \exists \alpha > 0, |x - x_0| < \alpha \Rightarrow |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$

III. الاتصال على اليمين والاتصال على اليسار في نقطة x_0

تعريف 01 :

f دالة عدديّة معرفة على $I_d = [x_0, x_0 + r]$ حيث $r > 0$. f متصل على يمين في x_0 يكافيء : $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = f(x_0)$

f دالة عدديّة معرفة على $I_g = [x_0 - r, x_0]$ حيث $r > 0$. f متصل على يسار في x_0 يكافيء : $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = f(x_0)$

أمثلة: 02



نأخذ النشاط السابق أدرس مبيانيا اتصال بعض من f على يمين و يسار النقطة $x_0 = 1$ مع $i \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$.

03 خاصية :

دالة f متصلة في x_0 يكفي f متصل على يسار و على يمين x_0 .

IV. التمديد بالاتصال في النقطة x_0

01 تذكير :

- . $g : F \rightarrow G$ و $f : E \rightarrow G$ دالتان عديتان حيث :
 - إذا كان $F \subset E$ و $\forall x \in F : f(x) = g(x)$
 - f تسمى تمديد بالاتصال (prolongement) لـ g
 - $g = f|_F$ تسمى قصور (restriction) على F . نكتب: $f|_F = g$

02 تعريف و خاصية :

- دالة عدبية يحتوي حيز تعريفها على مجال من نوع $I^*_{x_0} = [x_0 - r, x_0 + r] \setminus \{x_0\}$ مع $r > 0$. حيث :
- f غير معرفة في x_0
- $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \ell \in \mathbb{R}$

- x_0 هي متصلة في $\begin{cases} g(x) = f(x) ; x \in D_f, x \neq x_0 \\ g(x_0) = \ell \end{cases}$ الدالة g المعرفة بـ :
- الدالة g تسمى تمديد بالاتصال للدالة f في النقطة x_0

03 مثال:

- $D_f = \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$ لدينا : $f(x) = \frac{x^2 - |x|}{|x| - 1}$
- $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{|x|(|x| - 1)}{|x| - 1} \lim_{x \rightarrow 1} |x| = 1$
- هي تمديد بالاتصال للدالة f في النقطة $x_0 = 1$ و بالتالي الدالة g المعرفة بـ $\begin{cases} g(x) = \frac{x^2 - |x|}{|x| - 1} ; x \in \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\} \\ g(1) = 1 \end{cases}$
- كذلك الدالة h المعرفة بـ $\begin{cases} h(x) = \frac{x^2 - |x|}{|x| - 1} ; x \in \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\} \\ h(-1) = 1 \end{cases}$ هي تمديد بالاتصال للدالة f في النقطة $x_0 = -1$.



- ذلك الدالة k المعرفة بـ: $\begin{cases} k(x) = \frac{x^2 - |x|}{|x| - 1} ; x \in \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\} \\ k(-1) = k(1) = 1 \end{cases}$

ملحوظة : يمكن كتابة الدالة k خلي الشكل التالي :

V. اتصال دالة على مجال

01. تعاريف:

- f دالة متصلة على مجال مفتوح $I =]a; b[$ يكافي f متصلة في كل نقطة x_0 من I .
- f دالة متصلة على مجال $I = [a, b]$ يكافي f متصلة على $]a, b[$ و متصلة على يمين a و متصلة على يسار b .
- f دالة متصلة على مجال $[a, +\infty[$ يكافي f متصلة في كل نقطة x_0 من $[a, +\infty[$ و f متصلة على يمين في a .

02. مثال:

لنعتر الدالة: $f(x) = x^2 + 3x$.

بين أن f متصلة على المجال المفتوح $I =]1; 5[$.

VI. اتصال الدوال الاعتيادية:

01. خاصية:

- كل دالة حدودية فهي متصلة على مجموعة تعريفها $D_f = \mathbb{R}$
- كل دالة جذرية فهي متصلة على مجموعة تعريفها D_f .
- $D_f = \mathbb{R}$ متصلتين على $f(x) = \cos x$ و $f(x) = \sin x$
- الدالة: $D_f = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi; k \in \mathbb{Z} \right\}$ $f(x) = \tan x$
- الدالة: $D_f = \mathbb{R}^+ = [0, +\infty[$ $f(x) = \sqrt{x}$

VII. دالة الجزء الصحيح :

01. تعریف: (تذکیر)

الدالة f التي تربط كل عنصر x من \mathbb{R} بالعدد الصحيح النسبي الوحد p الذي يحقق $1 < p < x \leq p$. تسمى الدالة الجزء الصحيح

$f(x) = E(x) = p$ أو أياضا $f(x) = [x] = p$ نكتب

02. نشاط:

أنشئ منحنى الدالة (1) $f(x) = E(x)$

(2) هل f متصلة على يمين في 0 و 1 و 2 و 3 و 1 و 2 . - .


(3) هل f متصلة على يسار في 0 و 1 و 2 و 3 و 1 و 2 . - .

(4) هل f متصلة في 0 و 1 و 2 و 3 و 1 و 2

(5) هل f متصلة على $[0; 1[$ و $[1; 2[$ و $[2; 3[$ و

(6) أعط الخاصية.

الرسم 8





- دالة الجزء الصحيح متصلة على اليمين في p وغير متصلة على اليسار في p (إذن هي غير متصلة في p).
- دالة الجزء الصحيح متصلة على كل المجالات التي هي على شكل: $[p, p+1]$ (مع $p \in \mathbb{Z}$)

VIII. صورة مجال بدالة متصلة :

01 نشاط:

نأخذ النشاط أول الدرس و الرسم رقم 1 الذي يمثل الدالة: $f(x) = x^2$

(1) استنتج مبيانا صور جميع الأعداد التي تنتمي إلى القطعة $[0, 2]$

(2) استنتاج مبيانا: $f([-1, 2])$ و $f([-1, 0])$. أعط الخاصية.

02 خاصية:

- صورة قطعة $[a, b]$ بدالة متصلة f هي قطعة (تكون على شكل $[m, M]$ مع m و M هي القيمة الدنيا والقيمة القصوى على التوالي ل f على المجال $[a, b]$). (أو أيضا: $m = \min_{a \leq x \leq b} f(x)$ و $M = \max_{a \leq x \leq b} f(x)$)
- صورة مجال I بدالة متصلة f هي مجال $J = f(I)$.
- ملاحظة: $f([a, b]) = [m, M]$



مثال : 2 $f(x) = 2x - 1$ لبيانا :

مثال : 1

$$f([1, 2]) = [1, 3]$$



نضع: $M = \max_{a \leq x \leq b} f(x)$ و $m = \min_{a \leq x \leq b} f(x)$

$$\exists (\alpha, \beta) \in I^2 / m = f(\alpha) \text{ و } M = f(\beta)$$



IX. مبرهنة القيم الوسيطية: théorème des valeurs intermédiaires:

01 نشاط:



نأخذ $a = 1$ و $b = -2$ في الرسم 1 : $a = 0$ و $b = \pi$ (الرسم 2)
استنتج مبيانيا $f(a)$ و $f(b)$. (الرسم 1)

(1) نأخذ عدد k محصور بين $f(a)$ و $f(b)$ هل يوجد على الأقل

عنصر c من $[a,b]$ حيث $f(c) = k$ (الرسم 1)
أعط الخاصية:

02. خاصية:

- دالة متصلة على القطعة $[a,b]$.
- لكل عدد حقيقي k محصور بين $f(a)$ و $f(b)$ يوجد على الأقل عنصر c من $[a,b]$ حيث $f(c) = k$

03. برهان:

نضع $f([a,b]) = [m,M]$ لأن f متصلة على $[a,b]$.

حالة 1 : $f(a) \leq f(b)$

$\therefore k \in [m,M] = f([a,b])$ إذن $k \in [f(a),f(b)] \subset [m,M]$

ومنه : $\exists c \in [a,b] / k = f(c)$

إذن : كل عدد k محصور بين $f(a)$ و $f(b)$ يوجد على الأقل عنصر c من $[a,b]$ حيث $f(c) = k$

04. نتائج:

بما أن : صورة قطعة $[a,b]$ بدالة متصلة هي القطعة: $f([a,b]) = [m,M]$ إذن $f([a,b]) = [m,M]$

إذا كان : $f(a) < 0$ أي $f(a) \times f(b) < 0$ (اددهما موجب و الآخر سالب) ومنه يوجد

عنصر c من $[a,b]$ حيث $f(c) = 0$

نتيجة $f(a) \times f(b) < 0$: المعادلة $f(x) = 0$ تقبل على الأقل حل على $[a,b]$

إذا كانت f رتيبة قطعا على $[a,b]$ فإن c وحيد . ومنه المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حل وحيد على $[a,b]$

X. دالة متصلة و رتيبة قطعا:

01. نشاط: دالة متصلة و رتيبة قطعا. لدينا صور المجالات الآتية

f متصلة وتناقصية قطعا نحدد: المجال I	f متصلة وترابيدية قطعا نحدد: المجال I	المجال I	f متصلة وتناقصية قطعا نحدد: المجال I	f متصلة وترابيدية قطعا نحدد: المجال I	المجال I
$\left] \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x), \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) \right[$	$\left] \lim_{x \rightarrow a^+} f(x), \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \right[$	$]a, +\infty[$	$[f(b), f(a)]$	$[f(a), f(b)]$	$[a, b]$
$\left[f(a), \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) \right]$	$\left] \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x), f(a) \right]$	$]-\infty, a]$	$\left] \lim_{x \rightarrow b^-} f(x), f(a) \right]$	$\left[f(a), \lim_{x \rightarrow b^-} f(x) \right]$	$[a, b[$





$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x), \lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$	$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x), \lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$	$]-\infty, a[$	$[f(b), \lim_{x \rightarrow a^+} f(x)]$	$\left[\lim_{x \rightarrow a^+} f(x), f(b) \right]$	$]a, b]$
$\left] \lim_{x \rightarrow \infty} f(x), \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) \right[$	$\left] \lim_{x \rightarrow \infty} f(x), \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) \right[$	$]-\infty, +\infty[$	$\left] \lim_{x \rightarrow b^-} f(x), \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) \right[$	$\left] \lim_{x \rightarrow a^+} f(x), \lim_{x \rightarrow b^-} f(x) \right[$	$]a, b[$
$\left] \lim_{x \rightarrow \infty} f(x), \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) \right[$	$\left] \lim_{x \rightarrow \infty} f(x), \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) \right[$	$]-\infty, +\infty[$	$\left] \lim_{x \rightarrow \infty} f(x), f(a) \right]$	$\left[f(a), \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) \right]$	$[a, +\infty[$

نتيجة: 02

إذا كانت f دالة متصلة و رتبة قطعا على المجال $[a, b]$

- فإن كل عدد محصور بين $f(a)$ و $f(b)$ يوجد عدد وحيد c من $[a, b]$ حيث: $f(c) = k$.
- إذا كان $f'(x) < 0$ المعادلة $f(a) \times f(b) = 0$ تقبل حل وحيد.

XI. العمليات على الدوال المتصلة:

01. خاصية: (تقبل)

I مجال ضمن المجموعة $I \subset \mathbb{R}$.

- إذا كانت f و g دالتين متصلتين على المجال I فإن الدوال: $g + f$ و $g \times f$ و αf ($\alpha \in \mathbb{R}$) متصلة على I .
- إذا كانت f و g دالتين متصلتين على المجال I و g لا تنعدم على المجال I فإن الدوال: $\frac{f}{g}$ و $\frac{1}{g}$ متصلة على I .

02. مثال:

نعتبر الدوال التالية المعرفة بـ: (1) $f(x) = \frac{2x+1}{x-1} + \cos(x)$

(1) حدد مجموعة تعريف واتصال كل دالة من الدوال السابقة.

جواب

(1) حدد مجموعة تعريف:

الدالة $x \rightarrow \cos x$ معرفة و متصلة على \mathbb{R} .الدالة $x \rightarrow \frac{2x+1}{x-1}$ معرفة و متصلة على $\mathbb{R} \setminus \{1\}$.إذن الدالة $\frac{2x+1}{x-1} + \cos x$ معرفة و متصلة على $\mathbb{R} \setminus \{1\}$.الدالة $x \rightarrow x^2 + 3x - 2$ معرفة و متصلة على \mathbb{R} .الدالة $x \rightarrow \sqrt{x}$ معرفة و متصلة على $[0, +\infty[= \mathbb{R}^+$. إذن الدالة $D_g = \mathbb{R} \cap \mathbb{R}^+ = \mathbb{R}^+$

XII. اتصال مركبة دالتين متصلتين:

تذكير: $f(I) \subset J$ و $J \subset \mathbb{R}$

$$g \circ f : I \xrightarrow{f} f(I) \subset J \xrightarrow{g} \mathbb{R}$$

$$x \xrightarrow{f} f(x) \xrightarrow{g} g(f(x))$$



٠١. خاصية:

لتكن f و g دالتين عدديتين.
إذا كانت f متصلة على مجال I و g متصلة على مجال J حيث: $J \subset f(I)$ فإن الدالة $g \circ f$ متصلة على I .

٠٢. مثال: أدرس اتصال الدالة $f(x) = \sin(2x+1)$.

الدالة $x \rightarrow 2x+1$ متصلة على \mathbb{R} .

الدالة $x \rightarrow \sin(x)$ متصلة على \mathbb{R} . إذن الدالة: $(\sin x) \subset \mathbb{R}$. (لأنها مركبة دالتين متصلتين)

٠٣. نتائج:

$f(x) = \sin(ax+b)$ و $g(x) = \cos(ax+b)$ دالتان متصلتان على \mathbb{R} .

الدالة $h(x) = \tan(ax+b)$ متصلة في كل x تحقق ما يلي $ax+b \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$

دالة موجبة و متصلة على المجال I فإن الدالة $\sqrt{f(x)}$ متصلة على I .

XIII. الدالة العكسية لدالة متصلة و رتبة على قطعا على مجال:

٠١. نشاط: $I = [0; +\infty]$ على $f(x) = x^2$

(1) مبيانا هل الدالة f متصلة و رتبة قطعا على المجال $[0; +\infty]$.

(2) استنتج مبيانا $J = f(I)$ (أي صورة المجال I بـ f).


(3) هل لكل y من J له سبق وحيد c من I .

(4) استنتاج طبيعة التطبيق f .

(5) لنعتبر المعادلة: $(E): x \in I = [0, +\infty] / f(x) = y$

استنتاج عدد حلول المعادلة (E) .

٠٢. خاصية:



f دالة عدديّة متصلة و رتبة قطعا على مجال I و (I) .

الدالة f هي تقابل من I إلى $f(I)$.

المعادلة: $x \in I / f(x) = y$ تقبل حل وحيد على I .

٠٣. برهان:

بما أن صورة مجال I بدالة متصلة f هو المجال $f(I)$ إذن الدالة f شمولية من I نحو $f(I)$.

نبين أن f تباينية من I نحو $f(I)$.

نفترض أن f تزايدية قطعا على I .

أي نبين: $\forall x, x' \in I : x \neq x' \Rightarrow f(x) \neq f(x')$. أو أيضا: $\forall x, x' \in I : f(x) = f(x') \Rightarrow x = x'$

ليكن x و x' من I حيث $x \neq x'$ (أي $x < x'$ أو $x > x'$).

حالة 1: $x < x'$

إذن $f(x) < f(x')$ (لأن f تزايدية قطعا على I)

إذن $f(x) \neq f(x')$

حالة 2: $x > x'$

إذن $f(x) > f(x')$ (لأن f تزايدية قطعا على I)

إذن $f(x) \neq f(x')$

ENNAJAH.MA
رفيقكم الدائم



خلاصة : $f(x) \neq f(x')$ أي f تباينية من I نحو (I) حالـة f تزايدية قطعا على I .

❖ نفترض أن f تناصـية قطعا على I . بنفس الطريقة نبين أن : f تباينية من I نحو (I) .

خلاصة : الدالة f هي تقابل من I إلى $f(I)$.

تعريف: 04

f تقابل من I إلى J . الدالة g المعرفة بما يلي:

$$g : J \rightarrow I$$

$$y \rightarrow g(y) = x$$

مع $f(x) = y$ تسمى الدالة العكسـية للدالة f ونرمز لها: $g = f^{-1}$

ملاحظة: 05

▪ الدالة f معرفـة كما يلي:

$$x \rightarrow f(x) = y$$

▪ الدالة f^{-1} معرفـة كما يلي:

$$y \rightarrow f^{-1}(y) = x$$

$$\left. \begin{array}{l} f(x) = y \\ x \in I \end{array} \right\} \Leftrightarrow \left. \begin{array}{l} f^{-1}(y) = x \\ y \in J \end{array} \right\}$$

$$\forall y \in J : f \circ f^{-1}(y) = y . \forall x \in I : f^{-1} \circ f(x) = x$$

▪ ويمكن كتابـة $y = f \circ f^{-1}(x) = x$ كذلك على الشكل التالي :

06 خصـيات الدالة العـكسـية: (تقـبـل)


f دالة عـددـية متـصلـة و رـتـيـبة قـطـعا على مـجـال I و $J = f(I)$. الدالة العـكسـية لـ f .

1. الدالة f^{-1} متـصلـة على المـجـال $(I) = f(J)$. (تقـبـل)

2. الدالة f^{-1} رـتـيـبة قـطـعا على المـجـال J و لها نفس رـتـابـة f على I

3. (منـحـنى الدـالـة f^{-1} و (C_f) منـحـنى الدـالـة f مـتـماـثـلـان بـالـنـسـبـةـ لـالـمـسـتـقـيم (D) الذـي مـعـادـلـتـه $y = x$) في مـعـلـمـ مـتـعـامـدـ

منظم (المـسـتـقـيم (D) يـسـمـىـ المنـصـفـ الأولـ)



07. مـثـالـ: لنـتـعـتـرـ الدـالـة f المـعـرـفـةـ بـ:

أـ مـبـيـانـياـ هـل f مـتـصـلـةـ عـلـىـ $[0; +\infty]$.

بـ اـسـتـنـتـجـ رـتـابـةـ f عـلـىـ I .

جـ - حـدـدـ: $J = f(I)$.

دـ - هـلـ f تـقـبـلـ دـالـةـ عـكـسـيـةـ مـعـرـفـةـ عـلـىـ مـجـالـ يـجـبـ تـحـديـدـهـ.

2) حـدـدـ: $f^{-1} \circ f \circ f^{-1}$ (منـحـنى الدـالـة f). (منـحـنى الدـالـة f^{-1})



08. مفردات :

الدالة العكسية f^{-1} المحصل عليها تسمى كذلك الجذر من الرتبة 2 . ونرمز لها بـ $\sqrt[2]{\cdot}$ أو باختصار :

الدالة قوس الظل : XIV.

01. خاصية :

$$\text{الدالة } f(x) = \tan x \text{ تقابل من } J = \mathbb{R} \text{ إلى } I = \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right]$$

دالتها $f^{-1} = \arctan$ تسمى الدالة قوس الظل ونرمز لها بـ .

$$\begin{aligned} f^{-1} : \mathbb{R} \rightarrow I &= \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right] \\ \text{لدينا : } x \mapsto f^{-1}(x) &= \arctan x \end{aligned}$$

02. برهان :

لدينا الدالة $f'(x) = 1 + \tan^2 x > 0$ لأن $I = \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right]$ متصلة على و تزايدية قطعاً على . إذن

. $\lim_{x \rightarrow -\frac{\pi}{2}^+} \tan x = -\infty$ و $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} \tan x = +\infty$ لأن $f(I) = \mathbb{R}$ إلى $I = \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right]$ تقابل من

03. نتائج :

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R} \rightarrow I &= \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right] \\ \text{لدينا : } x \mapsto f(x) &= \arctan x \end{aligned}$$

. مجموعة تعريف الدالة $f(x) = \arctan x$ هي .

$$\forall x \in \mathbb{R} ; -\frac{\pi}{2} < \arctan x < \frac{\pi}{2}$$

. الدالة $f(x) = \arctan x$ متصلة و تزايدية على .

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \arctan x = -\frac{\pi}{2} \text{ و } \lim_{x \rightarrow +\infty} \arctan x = \frac{\pi}{2}$$

$$\begin{cases} \tan x = y \\ x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right] \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \arctan y = x \\ y \in \mathbb{R} \end{cases}$$

$$\forall x \in \mathbb{R} ; \tan(\arctan x) = x$$


$$\forall x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right] ; \arctan(\tan x) = x$$

. منحى (C_f) للدالة $f^{-1}(x) = \arctan x$ هو مماثل $(C_{f^{-1}})$

منحى الدالة $f(x) = \tan x$ بالنسبة للمنصف الأول في

معلم متعدد منظم .

. (المنصف الأول هو المستقيم (D) الذي معادلته $y = x$) .





٤. تمارين تطبيقية :

$f(x) = \arctan \frac{1}{x-1}$.

- أحسب : $f(0)$ و $f(2)$ و $f\left(1+\sqrt{3}\right)$.
- $f\left(1+\frac{1}{\tan\left(\frac{9\pi}{4}\right)}\right)$

- أحسب : $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

XV. دالة الجذر من الرتبة n

١. نشاط:

. لنعتبر الدالة $f(x) = x^n$ على المجال $I = [0; +\infty]$.

بين أن الدالة f تقبل دالة عكسية f^{-1} على المجال J حده.

٢. مفردات:

- الدالة العكسية f^{-1} تسمى الدالة الجذر من الرتبة n .
- الدالة العكسية f^{-1} يرمز لها بـ: $\sqrt[n]{x}$.
- نكتب: $f^{-1}(x) = \sqrt[n]{x} = x^{\frac{1}{n}}$. أو أيضاً $f^{-1}(x) = \sqrt[n]{x}$.
- حالة : $n = 1$ لدينا $f^{-1}(x) = \sqrt[1]{x} = x$ (حالة غير مهمة).
- حالة : $n = 2$ لدينا $f^{-1}(x) = \sqrt[2]{x} = \sqrt{x}$. (الدالة تسمى باختصار الجذر المربع)
- حالة : $n = 3$ لدينا $f^{-1}(x) = \sqrt[3]{x} = x^{\frac{1}{3}}$. (الدالة تسمى باختصار الجذر المكعب أو الجذر الثالث).

٣. تعريف و خاصية:

- n عدد صحيح طبيعي غير منعدم.
- الدالة $f(x) = x^n$ متصلة و تزايدية قطعا على $I = [0; +\infty]$.
- f^{-1} تقابل من I إلى $[0, +\infty]$ و دالتها العكسية f^{-1} تسمى الدالة الجذر من الرتبة n و نرمز لها: $\sqrt[n]{x}$.
- نكتب : $f^{-1}(x) = \sqrt[n]{x} = x^{\frac{1}{n}}$. أو أيضاً: $f^{-1}(x) = \sqrt[n]{x}$.
- العدد: $\sqrt[n]{a}$ يسمى الجذر من الرتبة n للعدد الحقيقي الموجب a .

٤. خاصية:

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{x} = +\infty$. $\forall x \geq 0$; $\left(\sqrt[n]{x}\right)^n = x$ و $\sqrt[n]{x^n} = x$. $\sqrt[1]{1} = 1$; $\sqrt[0]{0} = 0$.
- منحنى C_f لدالة $f^{-1}(x) = \sqrt[n]{x}$ هو مماثل (منحنى الدالة $f(x) = x^n$) بالنسبة للمنصف الأول في معلم متواحد منظم (المنصف الأول هو المستقيم D الذي معادلته $y = x$.)





- $\forall a \in \mathbb{R}^+ ; \forall b \in \mathbb{R}^+ ; \sqrt[n]{a} = \sqrt[n]{b} \Leftrightarrow a = b$
- $\forall a \in \mathbb{R}^+ ; \forall b \in \mathbb{R}^+ ; \sqrt[n]{a} \leq \sqrt[n]{b} \Leftrightarrow a \leq b$

. العمليات على الجذور من الرتبة n . XVI

. خصائص: 01

$$\text{. } \mathbb{N}^* \setminus \{1\} \text{ و } a \geq 0 \text{ و } b \geq 0 \text{ و } n \text{ و } m \text{ من }$$

$$\text{. } \sqrt[n]{a} \times \sqrt[m]{b} = \sqrt[nm]{a \times b}$$

$$(b > 0) ; \sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} \text{ و } (b > 0) ; \sqrt[n]{\frac{1}{b}} = \frac{1}{\sqrt[n]{b}}$$

$$\text{. } \sqrt[n]{\sqrt[m]{a}} = \sqrt[mn]{a} \text{ و } \sqrt[mn]{a^m} = \sqrt[n]{a}$$

: مثال 02

$$\text{بسط: } \sqrt[5]{\sqrt[3]{81}} \times \sqrt[15]{3^{11}}$$

$$\sqrt[5]{\sqrt[3]{81}} \times \sqrt[15]{3^{11}} = \sqrt[3]{81} \times \sqrt[15]{3^{11}}$$

$$\text{لدينا: } = \sqrt[15]{3^4 \times 3^{11}}$$

$$= \sqrt[15]{3^{15}} = 3$$

$$\text{خلاصة: } \sqrt[5]{\sqrt[3]{81}} \times \sqrt[15]{3^{11}} = 3$$

. بعض خصائص الدوال التي هي على شكل: $g(x) = \sqrt[n]{f(x)}$. XVII

. خصائص \oplus (تقبل) 01

. دالة عدديّة موجبة على مجال I . n من $\mathbb{N}^* \setminus \{1\}$

▪ إذا كانت $f(x)$ متصلة على I فإن $g(x) = \sqrt[n]{f(x)}$ متصلة على I.

▪ إذا كان $\lim_{x \rightarrow x_0} \sqrt[n]{f(x)} = \sqrt[n]{l}$ و $l \geq 0$ فإن: $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$

▪ إذا كان $\lim_{x \rightarrow x_0} \sqrt[n]{f(x)} = +\infty$ فإن: $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$

▪ تبقى الخصائص صحيحة إذا كان: $x \rightarrow x_0^-$; $x \rightarrow x_0^+$; $x \rightarrow \infty$

: تمارين تطبيقي 02

▪ نعتبر الدالة f المعرفة ب:

(1) حدد D_f مجموعة تعريف f .

(2) أحسب: $f(-1) ; f(15) ; f(0)$





(3) أحسب: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$

XVIII. القوى الجذرية لعدد حقيقي موجب قطعا:

01. نشاط:

$$\text{. } (3^2)^{\frac{1}{5}} = \left((3)^{\frac{1}{5}} \right)^2 \quad (1)$$

جواب:

$$(3^2)^{\frac{1}{5}} = \left((3)^{\frac{1}{5}} \right)^2 \quad \text{إذن} \quad \left((3)^{\frac{1}{5}} \right)^2 = (\sqrt[5]{3})^2 = \sqrt[5]{3} \times \sqrt[5]{3} = \sqrt[5]{9} \quad \text{و} \quad (3^2)^{\frac{1}{5}} = 9^{\frac{1}{5}} = \sqrt[5]{9}$$

02. كتابة جديدة:

$$(3^2)^{\frac{1}{5}} = \left((3)^{\frac{1}{5}} \right)^2 = 3^{\frac{2}{5}} \quad \text{سنكتب: } (3^2)^{\frac{1}{5}} = \left((3)^{\frac{1}{5}} \right)^2$$

03. خاصية:

. $r \in \mathbb{Q}^*$ و $a \in \mathbb{R}^{+*}$

. $\sqrt[n]{a^m} = \sqrt[n]{a^{m'}}$ مع n و m' من \mathbb{N}^* و m و n من \mathbb{Z} فإن $r = \frac{m}{n} = \frac{m'}{n'}$

05. برهان:

لدينا:

$$\left(\sqrt[n]{a^m} \right)^{n'} = \sqrt[n]{a^{m \times n'}}$$

$$= \sqrt[n]{a^{m' \times n}} ; \quad \left(\frac{m}{n} = \frac{m'}{n'} \right)$$

$$= a^{m'}$$

$$\sqrt[n]{a^m} = \sqrt[n]{a^{m'}} \quad \text{ومنه:} \quad \sqrt[n]{\left(\sqrt[n]{a^m} \right)^{n'}} = \sqrt[n]{a^{m'}} \quad \text{إذن:} \quad \left(\sqrt[n]{a^m} \right)^{n'} = a^{m'}$$

خلاصة: $\sqrt[n]{a^m} = \sqrt[n]{a^{m'}}$

04. تعريف:

. $x \in \mathbb{R}^{+*}$ (مع $m \in \mathbb{Z}$ و $n \in \mathbb{N}^*$) و $r = \frac{m}{n} \in \mathbb{Q}^*$

الكتابة $\sqrt[n]{x^m}$ نرمز لها بـ: x^r أو أيضا بـ: $\sqrt[n]{x^m} = x^{\frac{m}{n}}$ أما $\sqrt[n]{x^m} = x^r$ يسمى القوة الجذرية للعدد x ذات الأس r .

$$\text{. } x^r = x^{\frac{m}{n}} = \left(\sqrt[n]{x} \right)^m = \sqrt[n]{x^m} \quad ■$$

05. أمثلة:

1. مثال 1: أكتب على شكل x^r ما يلي: $(\sqrt[5]{3})^{-32}$ و $(\sqrt[9]{21})^{-11}$ و $\sqrt[8]{3^5}$ و $\sqrt[13]{2^{-15}}$ و $(\sqrt[9]{7})^{11}$

2. مثال 2: أكتب بطريقة أخرى الأعداد التالية: $\sqrt[3]{8}; \sqrt[5]{11}; \sqrt[7]{3}; \sqrt[4]{3^{-5}}; \sqrt[4]{3^5}$



06. ملاحظة:

- تعريف الأس في \mathbb{Q} هو تمديد لتعريف الأس في \mathbb{Z} .

- لدينا : $0^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{0} = 0$ بمان : $\forall a > 0, \forall n \in \mathbb{N}^* : a^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{a^1} = \sqrt[n]{a}$ يمكن أن نصطلح أن : $0^{\frac{1}{n}} = 0$
 - الدالة $f(x) = (x-2)^{\frac{1}{3}}$ هي معرفة على $D_f = [2, +\infty]$ بالدالة $g(x_0) = 2$ حيث
- $$\begin{cases} g(x) = f(x) = (x-2)^{\frac{1}{3}} = \sqrt[3]{x-2} & ; x > 2 \\ g(x) = 0 & \end{cases}$$

07. خصائص القوى الجذرية:

x و y من \mathbb{R}^{+*} و r' و r من \mathbb{Q}^* . لدينا :

$$x^r > 0$$

$$x^r = x^{r'} \Leftrightarrow r = r'$$

$$x^r \times y^r = (x \times y)^r \quad \text{و} \quad x^r \times x^{r'} = x^{r+r'}$$

$$\frac{x^r}{x^{r'}} = x^{r-r'} \quad \text{و} \quad (x^r)^{r'} = x^{r \times r'} \quad \text{و} \quad x^{-r} = \frac{1}{x^r} \quad \text{و} \quad \left(\frac{x}{y}\right)^r = \frac{x^r}{y^r}$$

08. مثال: بسط ما يلي.

$$A = \left(2^{-\frac{1}{3}}\right)^5 \times \left(4^{-\frac{1}{2}}\right)^5 \times \left(8^{\frac{2}{3}}\right)^5 \quad (1)$$

$$B = \frac{\sqrt[3]{7} \times 7^{\frac{2}{3}}}{7^{-\frac{1}{4}}} \quad (2)$$

$$A = \left(2^{-\frac{1}{3}}\right)^5 \times \left(4^{-\frac{1}{2}}\right)^5 \times \left(8^{\frac{2}{3}}\right)^5 = (2)^{-\frac{5}{3}} \times (2^2)^{-\frac{5}{2}} \times (2^3)^{\frac{10}{3}} = (2)^{-\frac{5}{3}} \times (2^{-1}) \times (2^2) = (2)^{\frac{-5}{3}-1+2} = 2^{-\frac{2}{3}}$$

$$B = \frac{\sqrt[3]{7} \times 7^{\frac{2}{3}}}{7^{-\frac{1}{4}}} = \frac{7^{\frac{1}{3}} \times 7^{\frac{2}{3}}}{7^{-\frac{1}{4}}} = \frac{7^{\frac{1}{3}+\frac{2}{3}}}{7^{-\frac{1}{4}}} = 7^{1+\frac{1}{4}} = 7^{\frac{5}{4}}$$