

**الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا
الدورة الاستدراكية 2019
- الموضوع -**

***** RS24

+٢٠٢٨٤٤١١٦٤٥٤٥٩
٨٣٥٤٢١٦٥٧٣٢
٨ ٢٠٢٨٤٤٢٠٢٠٢٠٢
٨ ٣٥٦٣٨ ٨ ٣٥٦٣٨ ٨ ٣٥٦٣٨



المملكة العربية
وزارة التربية والتعليم
والتكوين المهني
والتعلم المالي والتوجه العلمي

المركز الوطني للتقويم والامتحانات والتوجيه

| 4 | مدة الاجاز | الرياضيات | المادة |
|---|------------|----------------------------------|------------------|
| 9 | المعامل | شعبة العلوم الرياضية : (أ) و (ب) | الشعبة أو المسلك |

- مدة إنجاز الموضوع هي أربع ساعات.
- يتكون الموضوع من أربعة تمارين مستقلة فيما بينها.
- يمكن إنجاز التمارين حسب الترتيب الذي يرغب فيه المترشح.

- التمرين 1 يتعلق بالأعداد العقدية.....(3.5 ن)
- التمرين 2 يتعلق بالاحتمالات.....(3 ن)
- التمرين 3 يتعلق بالبنيات الجبرية.....(3.5 ن)
- التمرين 4 يتعلق بالتحليل.....(10 ن)

لا يسمح باستعمال الآلة الحاسبة كيما كان نوعها

لا يسمح باستعمال اللون الأحمر بورقة التحرير

التمرين 1: (3.5 نقطة)

ليكن α عددا عقديا غير منعدم.

I- نعتبر في مجموعة الأعداد العقدية C المعادلة ذات المجهول z : $z^2 - i\alpha\sqrt{3}z - \alpha^2 = 0$

1- أ) تحقق أن مميز المعادلة (E_α) هو: $\Delta = \alpha^2$ 0.25

ب) حل في C المعادلة (E_α) 0.5

2- علما أن $\alpha = |\alpha|e^{i\lambda}$ ، اكتب حل المعادلة (E_α) على الشكل الأسني. 0.5

II- نفترض أن المستوى العقدي منسوب إلى معلم متعمد منظم مباشر $O; \bar{u}, \bar{v}$. نعتبر النقط Ω و M_1

$$\text{و } M_2 \text{ ذات الألحاق على التوالى } \alpha \text{ و } z_2 = \frac{-1+i\sqrt{3}}{2}\alpha \text{ و } z_1 = \frac{1+i\sqrt{3}}{2}\alpha \text{ و ليكن } R \text{ الدوران الذي مرکزه } O$$

و زاويته $\frac{\pi}{3}$.

1- أ) بين أن $R(M_1) = M_2$ و أن $R(\Omega) = M_1$ 0.5

ب) استنتج أن المثلثين OM_1M_2 و $O\Omega M_1$ متساويا الأضلاع. 0.25

2- أ) تحقق أن: $z_1 - z_2 = \alpha$ 0.25

ب) بين أن المستقيمين (OM_2) و (OM_1) متعمدان. 0.5

ج) استنتاج أن $O\Omega M_1 M_2$ معين. 0.25

3- بين أن لكل عدد حقيقي θ ، العدد $Z = \frac{z_2 - \alpha}{z_1 - \alpha} \div \frac{z_2 - |\alpha|e^{i\theta}}{z_1 - |\alpha|e^{i\theta}}$ حقيقي. 0.5

التمرين 2: (3 نقط)

يحتوي كيس على n كرة مرقمة من 1 إلى n ($n \in \mathbb{N}^*, n \geq 3$). نسحب، الواحدة تلو الأخرى و بدون إحلال، جميع الكرات من هذا الكيس. لا يمكن التمييز بين الكرات باللمس.

1- ما هو احتمال الحصول على الكرات 1 و 2 و 3 بالتتابع وفي هذا الترتيب؟ 1

2- ما هو احتمال الحصول على الكرات 1 و 2 و 3 في هذا الترتيب (سواء كانت متتابعة أم غير متتابعة؟)؟ 1

3- نعتبر المتغير العشوائي X الذي يساوي العدد الضروري من السحبات للحصول على الكرات 1 و 2 و 3. 1

حدد قانون احتمال المتغير X .

التمرين 3: (3.5 نقطة)

نعتبر الفضاء المتجهي $(V_2, +, .)$ الذي بعده.

$$\text{ليكن } (\vec{i}, \vec{j}) \text{ أساساً للفضاء } V_2. \text{ نضع: } \vec{e}_1 = \frac{1}{2}\vec{i} + \frac{1}{2}\vec{j} \text{ و } \vec{e}_2 = \frac{1}{2}\vec{i} - \frac{1}{2}\vec{j}$$

ليكن * قانون التركيب الداخلي المعرف في V_2 بما يلي:

$$\forall(x, y, x', y') \in \mathbb{R}^4 \quad (x\vec{i} + y\vec{j}) * (x'\vec{i} + y'\vec{j}) = (xx' + yy')\vec{i} + (xy' + yx')\vec{j}$$

أ-1) بين أن (\vec{e}_1, \vec{e}_2) أساس للفضاء V_2 0.25

$$\vec{e}_1 * \vec{e}_2 = \vec{e}_2 * \vec{e}_1 = \vec{0} \quad \text{و} \quad \vec{e}_2 * \vec{e}_2 = \vec{e}_2 \quad \text{و} \quad \vec{e}_1 * \vec{e}_1 = \vec{e}_1 \quad 0.25$$

$$\forall(X, X', Y, Y') \in \mathbb{R}^4 \quad (X\vec{e}_1 + Y\vec{e}_2) * (X'\vec{e}_1 + Y'\vec{e}_2) = XX'\vec{e}_1 + YY'\vec{e}_2 \quad 0.25$$

أ-2) بين أن القانون * تبادلي. 0.25

ب) بين أن القانون * تجميعي. 0.25

ج) بين أن القانون * يقبل عنصراً محايداً. 0.25

د) بين أن $(*, +, .)$ حلقة تبادلية واحدية. 0.25

3- ليكن $E_{\vec{u}} = \{\vec{0}\} - \{\vec{u}\}$. نعتبر: 0.25

أ) بين أن $(E_{\vec{u}}, +)$ زمرة جزئية للزمرة $(V_2, +)$ 0.25

ب) بين أن $(E_{\vec{u}}, +, .)$ فضاء متجهي جزئي للفضاء $(V_2, +, .)$ 0.25

ج) بين أن: $E_{\vec{u}}$ مستقر بالنسبة للقانون * \Leftrightarrow الأسرة $(\vec{u} * \vec{u}, \vec{u})$ مقيدة. 0.5

4- نفترض أن: $\mathbb{R}^* \rightarrow E_{\vec{u}}$. نعتبر التطبيق $\varphi: \mathbb{R}^* \rightarrow E_{\vec{u}}$; $\vec{u} * \vec{u} = \alpha \vec{u}$

$$x \mapsto \frac{x\vec{u}}{\alpha}$$

أ) بين أن φ تشاكل تقابلية من (\mathbb{R}^*, \times) نحو $(E_{\vec{u}}, *)$ 0.5

ب) بين أن $(E_{\vec{u}}, +, *, .)$ جسم تبادلي. 0.25

التمرين 4: (10 نقط)

الجزء I : نعتبر الدالة g المعرفة على $I = [-1, +\infty)$ بما يلي: $g(x) = 1 + x^2 - 2x(1+x)\ln(1+x)$

أ-1) بين أن: $\lim_{x \rightarrow -1^+} g(x) = 2$ 0.25

ب) بين أن: $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = -\infty$ 0.5

2- بين أن g قابلة للاشتقاق على I ، وأن: $(\forall x \in I) g'(x) = -2(1+2x)\ln(1+x)$

0.5

3- نعطي جدول تغيرات الدالة g :

| | | | | |
|---------|----|---------------------------------|---|-----------|
| x | -1 | $-\frac{1}{2}$ | 0 | $+\infty$ |
| $g'(x)$ | - | 0 | + | 0 |
| $g(x)$ | 2 | $\frac{5}{4} - \frac{\ln 2}{2}$ | 1 | $-\infty$ |

(أ) بين أنه يوجد عدد حقيقي موجب قطعاً واحداً α بحيث: $g(\alpha) = 0$

0.5

(ب) تحقق أن: $\alpha < 1$ (نأخذ: $\ln 2 = 0.7$)

0.25

(ج) استنتج أن: $(\forall x \in [\alpha, +\infty[) g(x) < 0)$ و $(\forall x \in]-1, \alpha[) 0 < g(x)$

0.5

الجزء II: نعتبر الدالة f المعرفة على $I = [-1, +\infty[$ بما يلي:

ليكن (C) المنحني الممثّل للدالة f في معلم متعمّد مننظم $(\vec{O}; \vec{i}, \vec{j})$

1- (أ) احسب $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x)$ ثم أول مبيانها النتيجة المحصل عليها.

0.5

ب) احسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ ثم أول مبيانها النتيجة المحصل عليها.

0.5

2- (أ) بين أن f قابلة للاشتقاق على I وأن $(\forall x \in I) f'(x) = \frac{g(x)}{(1+x)(1+x^2)^2}$

0.75

ب) اعط جدول تغيرات الدالة f على I

0.5

ج) تتحقق أن: $(\forall x \in I) f(x) \leq \frac{1}{2\alpha(1+\alpha)}$ و $f(\alpha) = \frac{1}{2\alpha(1+\alpha)}$

0.75

3- (أ) حدد معادلة المماس (T) للمنحني (C) في النقطة ذات الأصول 0 .

0.25

ب) بين أن: $(\forall x > 0) \ln(1+x) < x$

0.5

ج) استنتج أن: $(\forall x > 0) f(x) < x$

0.25

د) مثل مبيانا (T) و (C) . (نأخذ: $\alpha = 0.8$ و $cm = 2$)

1

الجزء III : نضع $J = \int_0^1 f(x) dx$

1- أ) باستعمال تغيير المتغير: $t = \frac{1-x}{1+x}$ ، بين أن:

0.5 ب) حدد، بالسنتمر مربع، مساحة الحيز المستوي المحصور بين المنحنى (C) و المستقيمات (T) و

$$x=1 \text{ و } x=0$$

2- باستعمال طريقة المتكاملة بالأجزاء، احسب: $K = \int_0^1 \frac{\arctan(x)}{1+x} dx$

1

انتهى

امتحان الوطني الموحد للبكالوريا
الدورة الاستدراكية 2019
- عناصر الإجابة -



المركز الوطني للتقويم والامتحانات والتوجيه

RR24

| | | | |
|---|------------|----------------------------------|------------------|
| 4 | مدة الاجاز | الرياضيات | المادة |
| 9 | المعامل | شعبة العلوم الرياضية : (أ) و (ب) | الشعبة أو المسلك |

| سلم التقييم | عنصر الإجابة | التمرین 1 |
|-------------|--|-----------|
| 0.25 | $\Delta = \alpha^2$ التحقق من أن مميز (E_α) هو: | (ا) -1 |
| 0.5 | $\frac{-1+i\sqrt{3}}{2}\alpha$ و $\frac{1+i\sqrt{3}}{2}\alpha$ حل (E_α) هما: | (ب) -1 |
| 0.5 | $\frac{1+i\sqrt{3}}{2}\alpha = \alpha e^{i(\lambda+\frac{\pi}{3})}$; $\frac{-1+i\sqrt{3}}{2}\alpha = \alpha e^{i(\lambda+\frac{2\pi}{3})}$ | 2 |
| 0.25x2 | $R(M_1) = M_2$ و $R(\Omega) = M_1$ | (ا) -1 II |
| 0.25 | استنتاج. | (ب) |
| 0.25 | التحقق. | (ا) |
| 0.5 | تعامد (OM_1) و (ΩM_2) | (ب) -2 |
| 0.25 | استنتاج. | (ج) |
| 0.5 | $\forall \theta \in \mathbb{R}, \frac{z_2 - \alpha}{z_1 - \alpha} \div \frac{z_2 - \alpha e^{i\theta}}{z_1 - \alpha e^{i\theta}} \in \mathbb{R}$ | -3 |

| سلم التقييم | عنصر الإجابة | التمرین 2 |
|-------------|---|-----------|
| 1 | نعتبر الحدث A: " الحصول على الكرات 1 و 2 و 3 بالتتابع وفي هذا الترتيب " | |
| 1 | $P(A) = \frac{\text{Card } A}{\text{Card } \Omega} = \frac{(n-2)(n-3)!}{n!} = \frac{1}{n(n-1)}$ | -1 |
| 1 | نعتبر الحدث B: " الحصول على الكرات 1 و 2 و 3 في هذا الترتيب (سواء كانت متتابعة أم غير متتابعة)" | -2 |
| | $P(B) = \frac{\text{Card } B}{\text{Card } \Omega} = \frac{C_n^3(n-3)!}{n!} = \frac{1}{3!}$ | |

| | | |
|--|---|----|
| | $X_n(\Omega) = \{3, \dots, n\}$ $\forall k \in X_n(\Omega) \quad P(X_n = k) = \frac{\text{Card}(X_n = k)}{\text{Card}\Omega} = \frac{C_3^1 C_{k-1}^2 2 A_{n-3}^{k-3} (n-k)!}{n!}$ $= \frac{3(k-1)(k-2)}{n(n-1)(n-2)}$ | -3 |
|--|---|----|

| سلم التقييم | عناصر الإجابة | التمرين 3 |
|-------------|---|-----------|
| 0.25 | V_2 أساس للفضاء (\vec{e}_1, \vec{e}_2) | (ا) |
| 0.25 | التحقق. | (ب) -1 |
| 0.25 | $\forall (X, X', Y, Y') \in \mathbb{R}^4 \quad (X\vec{e}_1 + Y\vec{e}_2) * (X'\vec{e}_1 + Y'\vec{e}_2) = XX'\vec{e}_1 + YY'\vec{e}_2$ | (ج) |
| 0.25 | تبادلية القانون * | (ا) |
| 0.25 | تجميعية القانون * | (ب) |
| 0.25 | $\vec{e}_1 + \vec{e}_2$ هو العنصر المحايد بالنسبة للقانون * | (ج) -2 |
| 0.25 | $(V_2, +, *)$ حلقة تبادلية واحدية. | (د) |
| 0.25 | $(V_2, +, +)$ زمرة جزئية للزمرة | (ا) |
| 0.25 | $(V_2, +, .)$ فضاء متوجهي جزئي للفضاء | (ب) -3 |
| 0.5 | 0.25..... الاستلزم المباشر. 0.25..... الاستلزم العكسي | (ج) |
| 0.5 | 0.25..... φ تشاكل من (\mathbb{R}^*, \times) نحو $(E_u, *, +)$ 0.25..... φ تقابل من \mathbb{R}^* نحو E_u | (ا) -4 |
| 0.25 | $(E_u, +, *, +)$ جسم تبادلي | (ب) |

| سلم التقييم | عناصر الإجابة | التمرين 4 |
|-------------|-------------------------------------|-----------|
| 0.25 | $\lim_{x \rightarrow 1^+} g(x) = 2$ | (ا) -1 -I |

| | | | |
|------|---|-----|-----|
| 0.5 | $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = -\infty$ | (ب) | |
| 0.5 | قابلية اشتقاق g على I $0.25 \dots (\forall x \in I) \quad g'(x) = -2(1+2x)\ln(1+x)$ | -2 | |
| 0.5 | وجود α 0.25 وحداثية α 0.25 | (إ) | |
| 0.25 | التحقق. | (ب) | -3 |
| 0.5 | 0.25 $(\forall x \in [-1, \alpha[) \quad 0 < g(x)$ 0.25 $(\forall x \in [\alpha, +\infty[) \quad g(x) < 0$ | (ج) | |
| 0.5 | حساب $f(x)$ 0.25 التأويل المبيانى للنتيجة | (إ) | -II |
| 0.5 | حساب $f(x)$ 0.25 التأويل المبيانى للنتيجة | (ب) | -1 |
| 0.75 | قابلية اشتقاق f على I 0.25 $0.5 \dots (\forall x \in I) \quad f'(x) = \frac{g(x)}{(1+x)(1+x^2)^2}$ | (إ) | |
| 0.5 | غيرات f على I | (ب) | |
| 0.75 | التحقق: 0.5 $f(\alpha) = \frac{1}{2\alpha(1+\alpha)}$ | -2 | |
| 0.25 | 0.25 $(\forall x \in I) \quad f(x) \leq \frac{1}{2\alpha(1+\alpha)}$ | (ج) | |
| 0.25 | معادلة مماس (T) للمنحنى (C) في النقطة ذات الأقصوى 0 | (إ) | -3 |
| 0.5 | $(\forall x > 0) \quad \ln(1+x) < x$ | (ب) | |

| | | | | | |
|------|---|--------------------------------------|-----|----|------|
| 0.25 | $(\forall x > 0) \quad f(x) < x$ | الاستنتاج: $f(x) < x$ | ج) | | |
| 1 | 0.25 التمثيل المباني للمستقيم (T) 0.75 التمثيل المباني للمنحنى (C) | | (د) | | |
| 1 | $J = \frac{\pi}{8} \ln 2$ | تغير المتغير: | (إ) | | |
| 0.5 | $\begin{aligned} A &= \left(\int_0^1 f(x) - x dx \right) \times u.a = \left(\int_0^1 (x - f(x)) dx \right) \times 4 \text{cm}^2 \\ &= \left(2 - \frac{\pi \ln 2}{2} \right) \text{cm}^2 \end{aligned}$ | | (ب) | -1 | -III |
| 1 | $K = \frac{\pi \ln 2}{8}$ | باستعمال متكاملة بالأجزاء، نحصل على: | -2 | | |