

I. تقديم الدالة $f(x) = \ln(x)$ (اللوغاريتم النيبيري) :

01. تقديم الدالة اللوغاريتم النيبيري :

❖ نشاط :

لنعتبر الدالة العددية المعرفة ب : $f:]0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$

$$x \rightarrow f(x) = \frac{1}{x}$$

(1) هل f تقبل دالة أصلية على المجال $]0, +\infty[$ ؟ علل جوابك(2) كم توجد من دالة أصلية F ل f حيث $F(1) = 0$ ؟

❖ مفردات :

الدالة الأصلية F للدالة $f(x) = \frac{1}{x}$ على $]0, +\infty[$ حيث $F(1) = 0$ ▪ نرسم لها ب $F(x) = \ln(x)$ ▪ الدالة F تسمى الدالة اللوغاريتم النيبيري

❖ تعريف :

الدالة الأصلية F للدالة $f(x) = \frac{1}{x}$ على المجال $]0, +\infty[$ و التي تنعدم في 1 (أي $F(1) = 0$) تسمى الدالة اللوغاريتم النيبيريو يرمز لها ب $F(x) = \ln(x)$

❖ ملحوظة :

بدلا من كتابة : $F(x) = \ln(x)$ نكتب : $f(x) = \ln(x)$

❖ نتائج :

▪ الدالة $f(x) = \ln(x)$ مجموعة تعريفها هي $D_f =]0, +\infty[$ ▪ $f(1) = \ln(1) = 0$ ▪ الدالة $f(x) = \ln(x)$ قابلة للاشتقاق على $]0, +\infty[$ و دالتها المشتقة هي $f'(x) = \left[\ln(x) \right]' = \frac{1}{x} > 0$ ▪ إذن الدالة $f(x) = \ln(x)$ تزايدية قطعا على $]0, +\infty[$ ▪ $\forall a, b \in]0, +\infty[, a < b \Leftrightarrow \ln(a) < \ln(b)$ ▪ $\forall a, b \in]0, +\infty[, a = b \Leftrightarrow \ln(a) = \ln(b)$ 01. إشارة $\ln(x)$ هي كما يلي :إشارة $\ln(x)$: نعلم أن : $\ln(1) = 0$ لدينا : (1) $x > 1 \Rightarrow \ln(x) > 0$ (2) $0 < x < 1 \Rightarrow \ln(x) < 0$

x	0	1	$+\infty$
$\ln(x)$		-	0 +



تطبيق:

1) مجموعة تعريف الدالة أ - $f(x) = \frac{2}{\ln(x)}$ ب - $f(x) = \sqrt{\ln(x)}$

2) حل المعادلة: $\ln(2x) - \ln(x-1) = 0$

3) حل المتراجحة: $\ln(2x) - \ln(x-1) \leq 0$

02. المشتقة اللوغاريتمية لدالة:

❖ تعريف و خاصية:

لتكن u دالة قابلة للاشتقاق على مجال I $\forall x \in I : u(x) \neq 0$.الدالة: $f(x) = \ln|u(x)|$ قابلة للاشتقاق على المجال I و دالتها المشتقة هي: $f'(x) = \left[\ln|u(x)| \right]' = \frac{u'(x)}{u(x)}$ (أي المشتقة اللوغاريتمية ل u على I).الدالة $x \rightarrow \frac{u'(x)}{u(x)}$ تسمى المشتقة اللوغاريتمية للدالة u على المجال I .

❖ برهان:

لدينا: u دالة قابلة للاشتقاق على مجال I إذن u متصلة على I . بمأن: $\forall x \in I : u(x) \neq 0$ إذن $u(x) < 0$ و إما $u(x) > 0$.• حالة: $u(x) > 0$ ومنه: $f(x) = \ln|u(x)| = \ln(u(x))$ بمأن $u(x) > 0$ إذن $u(I) \subset]0, +\infty[$ ومنه الدالة $x \rightarrow \ln(x)$ قابلة للاشتقاق على $u(I)$ ومنه: $I \xrightarrow{u} u(I) \xrightarrow{\ln} \mathbb{R}$ $x \longrightarrow u(x) \longrightarrow \ln(u(x)) = \ln \circ u(x)$ إذن: f قابلة للاشتقاق لأنها مركبة دالتين قابلتين للاشتقاق ومنه:

$$f'(x) = [\ln|u(x)|]' = [\ln(u(x))]' = [\ln \circ u(x)]' = u'(x) \times \ln' \circ u(x) = u'(x) \times \frac{1}{u(x)} = \frac{u'(x)}{u(x)}$$

• حالة: $u(x) < 0$ ومنه: (بنفس الطريقة نبرهن على ذلك)

❖ مثال:

نحسب: f' مع $f(x) = [\ln|x^2 - x|]$

لدينا: $f'(x) = [\ln|x^2 - x|]' = \frac{(x^2 - x)'}{x^2 - x} = \frac{2x - 1}{x^2 - x}$

❖ مثال:

لنعتبر الدالة: $u(x) = 3x^2 - 5x$ أوجد الدالة المشتقة اللوغاريتمية ل u . الدالة المشتقة اللوغاريتمية ل u هي الدالة: $x \rightarrow \frac{6x - 5}{3x^2 - 5x}$

❖ استنتاج

لتكن u دالة قابلة للاشتقاق على مجال I حيث $\forall x \in I : u(x) \neq 0$ الدوال الأصلية للدالة: $x \rightarrow \frac{u'(x)}{u(x)}$ على المجال I هي الدوال التي على شكل $F(x) = \ln|u(x)| + c$ مع $(c \in \mathbb{R})$.



❖ تمرين :

❖ أوجد الدوال الأصلية للدالة: $f(x) = \frac{5}{x-2}$ على $]2, +\infty[$

03. الخصائص الجبرية:

❖ خاصيات:

لكل a و b من $]0, +\infty[$

$$\ln(a \times b) = \ln(a) + \ln(b) \quad \blacksquare$$

$$\ln\left(\frac{1}{b}\right) = -\ln(b) \quad \blacksquare$$

$$\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln(a) - \ln(b) \quad \blacksquare$$

$$\ln(a^r) = r \times \ln(a) \quad \text{مع } r \in \mathbb{Q} \quad \blacksquare$$

$$\ln(\sqrt[3]{a}) = \frac{1}{3} \times \ln(a) \quad \text{و} \quad \ln(\sqrt{a}) = \frac{1}{2} \times \ln(a) \quad \text{نستنتج:} \quad \blacksquare$$

❖ نبرهن على: $\ln(a \times b) = \ln(a) + \ln(b)$.نعتبر $a > 0$ (معلوم) و الدالة $f(x) = \ln(ax)$ ثم الدالة $g(x) = \ln(a) + \ln(x)$. ومنه $f(1) = \ln(a)$ و (1) و

$$(2) \quad g(1) = \ln(a)$$

• f و g معرفتين على $]0, +\infty[$.

$$\bullet \quad f'(x) = \left[\ln(ax) \right]' = \frac{(ax)'}{ax} = \frac{1}{x} \quad \text{و} \quad g'(x) = \left[\ln(a) + \ln(x) \right]' = \frac{1}{x} \quad \text{ومنه:} \quad f'(x) = g'(x) \quad \text{إذن:}$$

$$(3) \quad f(x) = g(x) + c \quad \text{مع } c \in \mathbb{R} \quad \text{إذن} \quad f(x) - g(x) = c \quad \text{وبالتالي} \quad (f(x) - g(x))' = 0$$

نأخذ $x = 1$ و منه $f(1) = g(1) + c$ و حسب (1) و (2) نحصل على $c = 0$ و بالتالي $f(x) = g(x)$ حسب (3).إذن: $f(x) = g(x) \Leftrightarrow \ln(ax) = \ln(a) + \ln(x)$ وذلك لكل $x \in]0, +\infty[$ نأخذ $x = b$ نحصل على

$$\ln(ab) = \ln(a) + \ln(b)$$

خلاصة: $\ln(ab) = \ln(a) + \ln(b) \quad \forall a, b \in]0, +\infty[$ ❖ نبرهن على: $\ln\left(\frac{1}{b}\right) = -\ln(b)$.نأخذ: $b > 0$ لدينا:

$$\ln(1) = 0 \Leftrightarrow \ln\left(\frac{b}{b}\right) = 0 \Leftrightarrow \ln\left(b \times \frac{1}{b}\right) = 0 \Leftrightarrow \ln(b) + \ln\left(\frac{1}{b}\right) = 0 \Leftrightarrow \ln\left(\frac{1}{b}\right) = -\ln(b)$$

خلاصة: $\ln\left(\frac{1}{b}\right) = -\ln(b)$.❖ نبرهن على: $\ln(a^r) = r \times \ln(a) \quad \text{مع } r \in \mathbb{Q}$ بنفس الطريقة المستعمل في البرهان $\ln(a \times b) = \ln(a) + \ln(b)$ مع اعتبار الدالة $f(x) = \ln(x^r)$ و الدالة $g(x) = r \ln(x)$



❖ تطبيق:

▪ نضع : $\ln(2) \approx 0,69$. أحسب : $\ln(4)$ و $\ln(8)$ ▪ بسط : $\ln(\sqrt{3}) + \ln(9)$ ▪ بسط : $\ln\left[(\sqrt{5})^{2012}\right] - \ln(\sqrt{5})$

❖ ملحوظة:

الكتابة : $\ln(x) \times \ln(x) = \ln^2(x)$ الكتابة : $\ln(x) \times \ln(x) \times \ln(x) = \ln^3(x)$ بصفة عامة : $\underbrace{\ln(x) \times \ln(x) \times \dots \times \ln(x)}_n = \ln^n(x)$, $n \in \mathbb{N}^*$ ❖ تطبيق: بسط : $\ln^2(3 - \sqrt{2}) - \ln^2(3 + \sqrt{2})$

04. نهايات اعتيادية :

❖ خاصيات:

الدالة : $f(x) = \ln(x)$ معرفة على $D_f =]0, +\infty[$ إذن:▪ $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln(x) = -\infty$ ومنه الدالة f تقبل مقارب عمودي معادلته : $x = 0$ (اي محور الأرتيب)▪ $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x) = +\infty$ (ومنه يجب دراسة الفرع اللانهائي بجوار $+\infty$)▪ $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{x} = 0$ ومنه $a = 0$ إذن الدالة f تقبل فرع شلجمي في اتجاه محور الأفاصيل.▪ $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} x \times \ln(x) = 0^-$ ❖ برهان ل : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x) = +\infty$ ليكن $A > 0$ نعتبر n أصغر عدد صحيح طبيعي حيث $n \ln(2) > A$ إذن $n \geq E\left(\frac{A}{\ln 2}\right) + 1$.

ومنه :

إذا كان : $x > 2^n$ فإن : $\ln(x) > \ln(2^n)$ $\Rightarrow \ln(x) > n \ln(2)$ $\Rightarrow \ln(x) > A$; $(n \ln(2) > A)$ ومنه : $\forall A > 0, \exists B = 2^n > 0, x > B \Rightarrow \ln(x) > A$.خلاصة : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x) = +\infty$.❖ برهن على : $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln(x) = -\infty$ (يمكنك أن تضع $X = \frac{1}{x}$) .❖ برهن على : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{x} = 0$



1. يمكنك اعتبار الدالة $f(x) = 2\sqrt{x} - \ln(x)$. ثم ادرس رتبة f على $[1, +\infty[$

2. استنتج : $0 \leq \frac{\ln(x)}{x} \leq \frac{2}{\sqrt{x}}$ ثم النهاية $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{x}$.

❖ **نبرهن على :** $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} x \times \ln(x) = 0^-$.

نضع : $X = \frac{1}{x}$ ومنه : $x \rightarrow 0^+$ فإن $X \rightarrow +\infty$.
إذن :

$$\begin{aligned} \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} x \times \ln(x) &= \lim_{X \rightarrow +\infty} \frac{1}{X} \times \ln\left(\frac{1}{X}\right) \\ &= \lim_{X \rightarrow +\infty} \frac{1}{X} \times (-\ln X) \\ &= \lim_{X \rightarrow +\infty} \frac{-\ln X}{X} \\ &= 0 \end{aligned}$$

خلاصة : $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} x \times \ln(x) = 0^-$

❖ **تطبيق:** أحسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x+2)}{x}$

05. نهايات ضرورية معرفتها :
❖ خاصيات:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln(x)}{x-1} = 1 \quad \text{و} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x+1)}{x} = 1$$

$$n \in \mathbb{N}^*; \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{x^n} = 0 \quad \text{و} \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} x^n \times \ln(x) = 0^-$$

❖ **نبرهن على** $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln(x)}{x-1} = 1$

1. ادرس اشتقاق الدالة $f(x) = \ln x$ في $x_0 = 1$.

2. استنتج نهاية : $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln(x)}{x-1}$

❖ **نبرهن على** $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x+1)}{x} = 1$ يمكنك استعمال نفس الطريقة مع $f(x) = \ln(x+1)$ و $x_0 = 0$

❖ **تطبيق:** أحسب : $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x+1)}{x^3}$ و $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{1}{x \times \ln(x)}$


06. دراسة الدالة $f(x) = \ln(x)$

• حسب ما سبق نستنتج: جدول تغيرات f



x	0	1	$+\infty$
f'		+	
f			$+\infty$

- إنشاء منحنى الدالة: f في م. م. $(0, i, j)$



❖ نتائج:

- الدالة $f(x) = \ln(x)$ متصلة و تزايدية قطعاً على $]0, +\infty[$
- f تقابل من $]0, +\infty[$ إلى $]-\infty, +\infty[$
- المعادلة $f(x) = 1$ (أي $\ln(x) = 1$) تقبل حلاً وحيداً على $]0, +\infty[$ ونرمز لهذا الحل بـ: e مع $(e \approx 2,718)$ عدد اللاجذري
- $\forall r \in \mathbb{Q} : r = \ln(e^r)$

❖ مثال:

$$3 = \ln(e^3) \text{ و } -\frac{2}{7} = \ln\left(e^{-\frac{2}{7}}\right)$$

❖ تطبيق:

$$f(x) = \frac{1}{3 - \ln(x)} \text{ حدد مجموعة تعريف الدالة:}$$

II. دالة اللوغاريتم للأساس a مع: $a \in]0, 1[\cup]1, +\infty[$

❖ تعريف:

ليكن a من $]0, 1[\cup]1, +\infty[$ (a عدد موجب قطعاً و $a \neq 1$)

الدالة المعرفة كما يلي: $f :]0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$

$$x \rightarrow f(x) = \frac{\ln(x)}{\ln(a)}$$

تسمى دالة اللوغاريتم للأساس a ونرمز لها بـ $\log_a$.



❖ نتائج:

$$\log_a(1) = \frac{\ln(1)}{\ln(a)} = 0 \quad \text{و} \quad \log_a(x) = \frac{\ln(x)}{\ln(a)}$$

$$\log_a(a) = \frac{\ln(a)}{\ln(a)} = 1$$

$$\log_a(e) = \frac{\ln(e)}{\ln(a)} = \frac{1}{\ln(a)}$$

❖ ملحوظة:

$$\log_e = \ln \quad \text{إذن} \quad \log_e(x) = \frac{\ln(x)}{\ln(e)} = \ln(x)$$

❖ خاصيات:

لكل x و y من $]0, +\infty[$ و $a \in]0, 1[\cup]1, +\infty[$

$$\log_a(x \times y) = \log_a(x) + \log_a(y)$$

$$\log_a\left(\frac{1}{y}\right) = -\log_a(y)$$

$$\log_a\left(\frac{x}{y}\right) = \log_a(x) - \log_a(y)$$

$$r \in \mathbb{Q} \quad \text{مع} \quad \log_a(x^r) = r \times \log_a(x)$$

$$\log_a(\sqrt[3]{x}) = \frac{1}{3} \times \log_a(x) \quad \text{و} \quad \log_a(\sqrt{x}) = \frac{1}{2} \times \log_a(x)$$

❖ نبرهن على: $\log_a(x \times y) = \log_a(x) + \log_a(y)$

$$\log_a(x \times y) = \frac{\ln(x \times y)}{\ln(a)} = \frac{\ln(x) + \ln(y)}{\ln(a)} = \frac{\ln(x)}{\ln(a)} + \frac{\ln(y)}{\ln(a)} = \log_a(x) + \log_a(y)$$

$$\text{إذن:} \quad \log_a(x \times y) = \log_a(x) + \log_a(y)$$

❖ ملحوظة:

في حالة: $a = 10$ الدالة: $f(x) = \log_{10}(x)$ تسمى الدالة اللوغاريتم العشري ويرمز لها باختصار: $f(x) = \text{Log}(x)$ إذن:

$$\log_{10} = \text{Log} \quad (\log_{10}(x) = \text{Log}(x) \approx 0,43 \ln(x))$$

$$\text{Log}(10^r) = r ; \text{Log}(10) = 1 ; \text{Log}(1) = 0$$

التمثيل المبياني لـ $f(x) = \log_a(x)$ نأخذ: $a = 2$ و $a = \frac{1}{2}$.



❖ تمارين تطبيقية :

بسط التعابير التالية:

(1) $\log_2(8) - \log_2(\sqrt[3]{32}) + \log_2(9) - \log_2(3)$

(2) $\log_3\left(\frac{15}{4}\right) + \log_2\left(\frac{1}{27}\right) + \log_3\left(\frac{4}{5}\right)$

(3) $\log(100) - \log(10^{2013}) + \log\left(\frac{1}{10^{100}}\right)$

(4) بين أن: $\forall a, b \in]1, +\infty[\log_b(a) = \frac{1}{\log_a(b)}$

(5) حل في $\mathbb{R}$ المعادلة: $\log_3(2x) \times (\log_5(x) - 1) = 0$

(6) حل في $\mathbb{R}$ المتراجحة: $\log_{\sqrt{3}}(3x-1) \geq \log_{\sqrt{3}}(x+1)$

(7) أدرس الدالة : $f(x) = \log_5(x+1)$

