

الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا
الدورة العادية 2014
الموضوع

٢٠١٤ | ٢٠١٤
٢٠١٤ | ٢٠١٤
٢٠١٤ | ٢٠١٤



المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية
والتكوين المهني

المركز الوطني للتقدير والامتحانات والتوجيه

NS 36

2	مدة الإنجاز	علوم الحياة والأرض	المادة
3	المعامل	شعبة العلوم الرياضية (أ)	الشعبة أو المسلك

يسمح باستعمال الآلة الحاسبة غير المبرمجة


التمرين الأول (4 نقط)

يَبْطِّيُّ الباحثون في علم وراثة الساكنة تغيير البنية الوراثية لساكنة معينة بعدها عوامل تُعدُّ الطفرة والانتقاء الطبيعي من بين هذه العوامل. من خلال نص واضح ومنظم:

- عَرَّفَ المفاهيم الآتية: الساكنة والطفرة والانتقاء الطبيعي. (1.5 ن)
- وَضَّحَّ تأثير كل من الطفرة والانتقاء الطبيعي في تغيير البنية الوراثية لساكنة. (2.5 ن)

التمرين الثاني (6 نقط)

I - تتميز دورة النمو عند الكائنات الحية بتعاقب ظاهرتي الانقسام الاختزالي والإخصاب. يُؤْمِنُ هذا التعاقب استمرارية النوع. لإبراز ذلك عند الطحلب الأخضر Cladophora نقترح المعطيات الآتية:
تُظَهِّر دورة نمو هذا الطحلب، المبينة في الوثيقة أسفله، ثلاثة أنواع من المشرات: 1 و 2 و 3. تحمل المشرة 1 أكياسا "A" تخضع داخلها كل خلية أم لانقسامين متتالين. وتحرر هذه الأكياس خلايا "a" أحادية الصبغية رباعية السوت. تنقسم كل خلية "a" عدة مرات فتقطعى المشرة 2 أو المشرة 3.
تحمل المشرتان 2 و 3 عند نضجهما أكياسا "B" و "C" تحرر خلايا صغيرة القد ثانية السوت "b" و "c".
ينتج عن التحام خليتين "b" و "c" خلية "d" تعطي، بعد انقسامات غير مباشرة متتالية، المشرة 1.




- 1- تعرّف الخلايا "a" والخلية "d" والمشرات 1 و 2 و 3. (1.25 ن)
- 2- أنجز رسمًا تخطيطيًّا للدورة الصبغية لهذا الطحلب محدداً نمطها. (1.25 ن)

- II** - دراسة كيفية انتقال بعض الصفات الوراثية عند نبات السمسم (*Sesamum indicum*)، نبات ثبائي الصبغة الصبغية، أنجذب التزاوجان الآتيان:
- التزاوج الأول** بين سلالتين من هذا النبات : سلالة ذات ساقات مفردة وأوراق عاديّة، وسلالة ذات ساقات متعددة وأوراق مطويّة، أعطى جيلا F_1 يتكون من نباتات ذات ساقات مفردة وأوراق عاديّة.
- التزاوج الثاني** بين نباتات F_1 أعطى جيلا F_2 مكوّناً من:
- 223 نبتة ذات ساقات مفردة وأوراق عاديّة.
 - 72 نبتة ذات ساقات مفردة وأوراق مطويّة.
 - 76 نبتة ذات ساقات متعددة وأوراق عاديّة.
 - 27 نبتة ذات ساقات متعددة وأوراق مطويّة.
- 3 - انطلاقاً من نتائج هذين التزاوجين، بين كيفية انتقال الصفتين المدروستين عند نبات السمسم.(1.25 ن)
- 4 - استنتج النمط الوراثي للأباء وأفراد الجيل F_1 . (0.75 ن)
- استعمل الرموز الآتية :
- G أو g لتمثيل الحليل المسؤول عن عدد الساقات (فرد أو متعدد).
 - F أو f لتمثيل الحليل المسؤول عن مظهر الأوراق (عادي أو مطوي).
- 5 - أعط التفسير الصبغي للتزاوج الثاني مستعيناً بشبكة التزاوج. (1.5 ن)

التمرين الثالث (4 نقاط)


قصد تعرّف كيفية انتقال مرض البلاهة فينيل بيروفيك (L'idiotie phénylpyruvique)، مرض وراثي يتميز بتأخر عقلي حاد يصاحبه تشوهات في الجهاز العصبي والأعضاء الحسية والهيكل العظمي، فقترح استئجار معطيات الوثيقة أسفله التي تمثل شجرة نسب عائلة بعض أفرادها مصابون بهذا المرض.



- 1 - استناداً إلى شجرة النسب أعلاه بين، معيلاً إجابتك، كيفية انتقال هذا المرض.(2 ن)
 - 2 - حدد الأنماط الوراثية للأفراد : II_1 و II_2 و III_5 و III_6 و III_7 و III_8 .(1 ن)
- استعمل الرمز N بالنسبة للhilil السادس والرمز n بالنسبة للhilil المتنحي.
- 3 - ترحب المرأة III_6 في إنجاب طفل رابع، وتتخوف من إنجابه مصاباً بالمرض، بإجازتك لشبكة التزاوج حدد احتمال إنجاب طفل سليم عند الزوجين III_5 و III_6 .(1 ن)

التمرين الرابع (6 نقاط)

لتحديد بعض مميزات التغير عند جماعة أسماك بوسيف (*Xiphias gladius*), تم إنجاز مدرج توزيع ترددات قد الأسماك المصطادة بمضيق جبل طارق (أسماك بوسيف المفرغة بميناء طنجة: الوثيقة 1) وقياس تغير قد الأسماك المصطادة بالبحر الأبيض المتوسط (أسماك بوسيف المفرغة بميناء الناظور: الوثيقة 2).



[250-230]	[230-210]	[210-190]	[190-170]	[170-150]	[150-130]	[130-110]	[110-90]	[90-70]	الفئات: قد الأسماك بـ cm
0	1	2	3	16	60	218	502	56	عدد الأسماك المفرغة بميناء (الناظور)

الوثيقة 2

1- أنجز مدرج ومطلع الترددات لتوزيع قد أسماك بوسيف المصطادة بالبحر الأبيض المتوسط (الوثيقة 2). (1 ن)
استعمل السلم: 1 cm لكل فنة و 1cm لكل 50 فردا.

2- احسب قيم المعدل الحسابي والانحراف النمطي المعياري ومجال الثقة [$\sigma + \bar{X}$; $\bar{X} - \sigma$] عند جماعة أسماك بوسيف المصطادة بالبحر الأبيض المتوسط (ميناء الناظور: الوثيقة 2)، وذلك باعتماد جدول تطبيقي لحساب الثابتات الإحصائية. (3 ن)

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_i^i f_i (x_i - \bar{X})^2}{n}} \quad \text{و} \quad \bar{X} = \frac{\sum_i^i (f_i x_i)}{n}$$

نعطي:

3- باستغلال الوثيقة 1 والتمثل البياني المنجز والثابتات الإحصائية، قارن توزيعي قد أسماك بوسيف المفرغة في كل من ميناء طنجة وميناء الناظور. استنتج اتجاه نزوح أحجام الأسماك بوسيف حسب القد؟ (2 ن)

الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا

الدورة العادية 2014

عناصر الإجابة

٢٠١٤

٢٠١٤ | ٢٠١٤

٢٠١٤ | ٢٠١٤

٢٠١٤ | ٢٠١٤



NR 36

2	مدة الإنجاز	علوم الحياة والأرض	المادة
3	المعامل	شعبة العلوم الرياضية (أ)	الشعبة أو المسلك

رقم السؤال	عنصر الإجابة	سلم التقييم
------------	--------------	-------------

التمرين الأول (4 نقط)

تعريف صحيح يتضمن العناصر الآتية بالنسبة لكل مفهوم:

- الساكنة: أفراد نفس النوع - مجال جغرافي محدد - تزاوج بالصدفة - بنية دينامية.
- الطفرة: تغير وراثي - فجائي - نسبة ضعيفة جداً. يصيّب جزيئه ADN (المورثة).
- الانتقاء الطبيعي: عامل بيئي - أفراد ساكنة بمظهر خارجي معين - احتمال أكبر للعيش و / أو للتوالد - انتقال حليلات بشكل تقاضلي عبر الأجيال.....(1.5 ن)

تأثير الطفرة على البنية الوراثية للساكنة:

- ظهور حليلات جديدة مصدر أنماط ومظاهر وراثية جديدة داخل ساكنة طبيعية؛ ولا يظهر تأثير الطفرة في البنية الوراثية للساكنة (المحتوى الجيني) إلا بتعاقب عدة أجيال.....(1 ن)

تأثير الانتقاء الطبيعي على البنية الوراثية للساكنة:

- يؤدي الانتقال التقاضلي للحليلات عبر الأجيال الناتج عن الانتقاء الطبيعي إلى تغير في تردد الحليلات وبالتالي تغير في البنية الوراثية للساكنة.....(1.5 ن)

التمرين الثاني (6 نقط)

1	- الخلايا a : أبواغ أحادية الصيغة الصبغية؛ - الخلية d : بيضة ثنائية الصيغة الصبغية؛ - المشرة 1: نبات بوغي، المشرة 2 و المشرة 3 نباتان مشيجيان.....(0.75 ن)	1.25 ن
---	--	--------

2	- رسم تخطيطي صحيح للدورة الصبغية لهذا الطلب؛.....(1 ن) - دورة أحادية ثنائية الصيغة الصبغية.....(0.25 ن)	1.25 ن
---	--	--------

3	التزاوج الأول: - انتقال صفتين وراثيتين (عدد السنفات (g, G) ومظهر الأوراق(f, F))؛ هجونة ثنائية..(0.25 ن) - جيل F_1 متجانس؛ تتحقق القانون الأول لماندل؛ الآباء من سلالة ندية؛.....(0.25 ن) - سيادة الحليل المسؤول عن سنفات مفردة (G) على الحليل المسؤول عن سنفات متعددة (g) و سيادة الحليل المسؤول عن أوراق عادية (F) على الحليل المسؤول عن أوراق مطوية (f)؛.....(0.25 ن)	1.25 ن
---	---	--------


3	التزاوج الثاني: - نباتات F_1 هجينة ؛ - توزيع نسب المظاهر الخارجية المحصل عليها: 1/16؛ 3/16؛ 9/16؛ يدل على أن المورثتين مستقلتان.....(0.25 ن)	1.25 ن
---	---	--------

4	الأنماط الوراثية للأبوين P1 و P2 وأفراد F_1 : - الأبوان: P1 : G//G F//F ; P2 : g//g f//f(0.5 ن) - أفراد F_1 : F1 : G//g F//f(0.25 ن)	0.75 ن
---	--	--------

		التفسير الصبغي للتزاوج الثاني: $F_1 \times F_1$ + المظهر الخارجي : $[GF] \times [GF]$ + النمط الوراثي: $G//g \quad F//f \times G//g \quad F//f$ + الأمشاج: كل فرد ينتج/ $1/4 \ g/f, 1/4 \ g/F, 1/4 \ G/f, 1/4 \ G/F$ (0.5 ن) + شبكة التزاوج صحيحة: النتيجة $\leftarrow [gf], 1/16, 9/16, [GF], 3/16, [Gf], 3/16$ (0.75 ن) تطابق النسب النظرية مع النسب التجريبية يؤكّد استقلال المورثتين..... (0.25 ن) 1.5 ن	5												
		التمرين الثالث (4 نقط)													
2 ن		- الأبوان I_1 و I_2 سليمان وأنجبا بنتا مصابة II_2 : الحليل المسؤول عن المرض متاحي؛.....(0.5 ن) - الأب I_2 سليم أنجب بنتا مريضة؛ الحليل غير مرتبط بالصبغي الجنسي X ، إنجاب ذكور وإناث مصابين بالمرض: الحليل المسؤول عن المرض غير مرتبط بالصبغي الجنسي Y ، إذن المرض غير مرتبط بالجنس (قبول كل تعليل صحيح).....(1.5 ن)	1												
1 ن		- النمط الوراثي لفرد II_1 : $N//N$ أو $N//n$ (0.25 ن) - النمط الوراثي لفردين III_5 و III_6 : $n//n$ (0.5 ن) - النمط الوراثي - لفرد II_2 : $n // n$ (0.25 ن)	2												
1 ن		- احتمال إنجاب طفل سليم من قبل الزوجين III_5 و III_6 : $\begin{array}{ccc} III_6 & \times & III_5 \\ [N] & & [N] \\ N//n & & N//n \end{array}$ الأبوان المظهر الخارجي النمط الوراثي الأمشاج الممكنة (0.5 ن) شبكة التزاوج:	3												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>III_6</th> <th>III_5</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>$N / (1/2)$</td> <td>$N / (1/2)$</td> <td>$n / (1/2)$</td> </tr> <tr> <td>$N / (1/2)$</td> <td>$N//N (1/4) [N]$</td> <td>$N//n (1/4) [N]$</td> </tr> <tr> <td>$n / (1/2)$</td> <td>$N//n (1/4) [N]$</td> <td>$n//n (1/4) [n]$</td> </tr> </tbody> </table> - احتمال إنجاب طفل سليم من قبل الزوجين III_5 و III_6 : 75% (0.5 ن)	III_6	III_5		$N / (1/2)$	$N / (1/2)$	$n / (1/2)$	$N / (1/2)$	$N//N (1/4) [N]$	$N//n (1/4) [N]$	$n / (1/2)$	$N//n (1/4) [N]$	$n//n (1/4) [n]$	
III_6	III_5														
$N / (1/2)$	$N / (1/2)$	$n / (1/2)$													
$N / (1/2)$	$N//N (1/4) [N]$	$N//n (1/4) [N]$													
$n / (1/2)$	$N//n (1/4) [N]$	$n//n (1/4) [n]$													

التمرين الرابع (6 نقاط)

ن 1



إنجاز مدرج ومطلع ترددات صحيح
مع احترام السلم المقترن في الموضوع

1

ن 3

میناء الناضور:	ووسط الفئة x_i	$f_i x_i$	f_i	$f_i (x_i - \bar{x})^2$	$(x_i - \bar{x})^2$
	80	4480	56	44976.4	803.15
	100	50200	502	34914.1	69.55
	120	26160	218	29637.1	135.95
	140	8400	60	60141	1002.35
	160	2560	16	42700	2668.75
	180	540	3	15405.45	5135.15
	200	400	2	16803.1	8401.55
	220	220	1	12467.95	12467.95
	240	0	0	0	17334.35
		92960	858	257045.1	131.66
					المجموع

- (1.5 ن)

المعدل الحسابي: $\bar{x} = 92960 / 858 = 108,34 \text{ cm}$ (0.5 ن)

الانحراف النمطي المعياري: $\sigma = \sqrt{257045.1 / 858} = \sqrt{299.58} = 17.30$ (0.5 ن)

مجال الثقة: $[\bar{x} - \sigma = 91,04 ; \bar{x} + \sigma = 125,64]$

84% من أسماك بوسيف يتراوح قدها ما بين 91,04 cm و 125,64 cm (0.5 ن)

المقارنة:

يجب أن تتضمن المقارنة العناصر الآتية:

- مطلع الترددات أحادي المنوال في الحالتين: تجانس الجماعتين.

- قيم الثابتات الإحصائية لميناء طنجة أكبر بالنسبة لقيم الثابتات الإحصائية لميناء الناضور (تشتت أكبر بالنسبة لطنجة).

- 84% من أسماك بوسيف يتراوح قدها ما بين 91,04 cm و 125,64 cm بالنسبة للبحر الأبيض المتوسط (ميناء الناضور)، وحوالي 81% يتراوح قدها ما بين 116.49 cm و 170.01 cm بالنسبة لمضيق جبل طارق (ميناء طنجة).

- الأسماك الأكبر قدا توجد بمضيق جبل طارق (ميناء طنجة). (1 ن)

الاستنتاج:

- نزوح أسماك بوسيف الأكبر قدا في اتجاه مضيق جبل طارق (أو في اتجاه المحيط الأطلسي).

- نزوح أسماك بوسيف الأصغر قدا في اتجاه البحر الأبيض المتوسط. (1 ن)

ن 2

3