



# الامتحان الوطني الموحد للمكوريا

الدورة الاستدراكية 2018

-الموضوع-

RS 32

+٢٣٨٤٤١ ٩٤٥٤٠  
+٢٣٦٥٤ ٩٣٦٥٤  
٨٣٢٤٤٧ ٣٣٣٦٥  
٨٣٥٣٢٨ ٣٣٣٦٥



المملكة المغربية  
وزارة التربية الوطنية  
والتكوين المهني  
والتعلم المالي والبحث العلمي

المركز الوطني للنقويم والامتحانات  
والتوجيه

3

مدة الإنجاز

علوم الحياة والأرض

المادة

7

المعامل

شعبة العلوم التجريبية : مسلك علوم الحياة والأرض

الشعبة أو المسلك

يسمح باستعمال الآلة الحاسبة غير المبرمجة

**المكون الأول: استرداد المعرف (5 نقط)**

I. يوجد اقتراح واحد صحيح بالنسبة لكل معطى من المعطيات المرقمة من 1 إلى 4.  
أنقل(ي) الأزواج الآتية على ورقة تحريرك ثم أكتب(ي) داخل كل زوج الحرف المقابل للاقتراح الصحيح:  
(1 ، ....) ؛ (2 ، ....) ؛ (3 ، ....) ؛ (4 ، ....) ؛ (.....)

2. الأنديزيت صخرة صهارية:

- أ. تنتج عن تبريد سريع للصهارة في العمق.
- ب. تنتج عن تبريد بطيء للصهارة على السطح.
- ج. لها بنية ميكروبنية بها ميكروليفات وعيوب زجاجي.
- د. لها بنية حبيبية تتميز ببلورات كبيرة القد.

4. هالة التحول عبارة عن منطقة تحيط بالكرانيت:

- أ. الاندساي وتنتج عن تحول التماس.
- ب. الأناتيكتي وتنتج عن تحول التماس.
- ج. الاندساي وتنتج عن تحول إقليمي.
- د. الأناتيكتي وتنتج عن تحول إقليمي.

1. الفالق المعكوس بنية:

- أ. تنتج عن قوى تكتونية تمددية.
- ب. تميز بتباين كثافة الفالق.
- ج. تميز بسطح فالق عمودي.
- د. تميز بتقارب كثافتي الفالق.

3. تتشكل سلاسل الطمر نتيجة انغراز غلاف صخري:

- أ. محطي أقل كثافة تحت غلاف صخري قاري أكثر كثافة.
- ب. قاري أقل كثافة تحت غلاف صخري محطي أكثر كثافة.
- ج. محطي أكثر كثافة تحت غلاف صخري قاري أقل كثافة.
- د. قاري أكثر كثافة تحت غلاف صخري محطي أقل كثافة.

(0.5 ن)

(0.5 ن)

1. الأناتيكتية.

2. سحنة التحول.

II. عرف (ي) مايلي :

III. أنقل(ي) على ورقة تحريرك، الحرف المقابل لكل اقتراح من الاقتراحات الآتية، ثم أكتب(ي) أمامه "صحيح" أو "خطأ".  
(1 ن)

تنتح الصهارة الأنديزيتية عن انصهار جزئي لصخور سابقة الوجود تحت تأثير تحول يتميز بدرجة حرارة مرتفعة وضغط منخفض.

أ

تميز مناطق الطمر بتحول دينامي.

ب

تشير المتالية التحولية إلى مجموعة الصخور التي تشكلت في نفس ظروف درجة الحرارة والضغط.

ج

الشيشية والتوريق بنيةتان مميزتان لصخور المتحولة والصخور الصهارية.

د

IV. أعط (ي):

(0.5 ن)

(0.5 ن)

1. خاصيتين مميزتين لسلاسل الاصطدام.


2. خاصيتين مميزتين لسلاسل الطفو.

## المكون الثاني: الاستدلال العلمي والتواصل الكتابي والبياني (15 نقطة)

## التمرين الأول (3 نقط)


يمثل التنفس الخلوي مجموعة من التفاعلات التي تمكن الخلايا من إنتاج ATP، ويتم جزء منها في الميتوكندري. تعرف هذه التفاعلات أحياناً اضطرابات إثر التعرض لبعض المواد الكيميائية مثل L'antimycine A وهو مضاد حيوي تنتجه بعض الفطريات (فطر Streptomyces). يؤدي تعرّض الإنسان لهذه المادة إلى انعكاسات خطيرة على مستوى الاستقلاب الطاقي للخلايا. لتحديد كيفية تأثير Antimycine A نقترح المعطيات الآتية:

- ❖ المعطى 1: تمت إضافة محلول عالق من الميتوكوندريات لوسطين 1 و 2 مشبعين بثنائي الأوكسجين ويهتميان على ADP و Pi، مع الحفاظ على استقرار pH في قيمة 7,5 في هذين الوسطين.
- في الوسط 1: تم تتبع تطور تركيز كل من ثنائي الأوكسجين و ATP قبل وبعد إضافة حمض البيروفيك، ويبين الشكل (أ) من الوثيقة 1 النتائج المحصلة.
- في الوسط 2: تم تتبع تطور تركيز ثنائي الأوكسجين قبل وبعد إضافة كل من حمض البيروفيك في الزمن  $t_1$  و مادة Antimycine A في الزمن  $t_2$  ، ويبين الشكل (ب) من الوثيقة 1 النتائج المحصلة.



الشكل (ب)


الوثيقة 1



الشكل (أ)


1. ص(ي) النتائج المحصلة في الشكلين (أ) و(ب) من الوثيقة 1 ثم اقترح(ي) فرضية تفسر العلاقة بين مادة Antimycine A وإنماض ATP.

❖ المعطى 2: يحتوي الغشاء الداخلي للميتوكندري على مركبات بروتوبلاستية تشكل السلسلة التنفسية. تبين الوثيقة 2 تسلسل تفاعلات أكسدة - اختزال التي تحدث خلال انتقال الإلكترونات عبر مركبات السلسلة التنفسية وموقع تأثير مادة Antimycine A . تقدم الوثيقة 3 رسمياً تخطيطياً لأآلية تركيب ATP في الغشاء الداخلي للميتوكندري.



الوثيقة 2


الوثيقة 3



## 2. باستثمار الوثيقة 2:

- أ. بين(ي) العلاقة بين منحى انتقال الإلكترونات وجهد أكسدة اختزال لمختلف مركبات السلسلة التنفسية. (0.25 ن)
- ب. فسر(ي) تأثير إضافة مادة A على تركيز ثنائي الأوكسجين المبين في الشكل (ب) للوثيقة 1. (0.5 ن)
3. مستعيناً بالوثيقتين 2 و3، فسر(ي) تأثير مادة A على إنتاج ATP من طرف الخلايا. (0.75 ن)

## التمرين الثاني (5 نقاط)




في إطار دراسة انتقال الخبر الوراثي وبعض آليات تعبيره،  
نقترح المعطيات الآتية:

## ❖ المعطى الأول:


يسمح الانقسام غير المباشر بتكاثر وتتجدد الأنسجة الحية ويشكل مع مرحلة السكون دورة خلوية. يقدم شكلان الوثيقة 1 مرحلتين من مراحل هذه الدورة عند خلية حيوانية. يمثل الشكل (أ) مرحلة السكون ويمثل الشكل (ب) الطور التمهيدي.

1. استخرج(ي) التغيرات التي تطرأ على النواة والسيتوبلازم  
عند الانتقال من مرحلة السكون إلى الطور التمهيدي. (1 ن)



## ❖ المعطى الثاني:

توجد بالنواة عدة أصناف من بروتينات ليفية تسمى "Lamines" مسؤولة عن بنية النواة. يترتب عن حدوث خلل في أحد أصناف هذه البروتينات "Lamine A" عند الإنسان ظهور داء "Progeria". من بين أعراض هذا الداء صغر القد وأضطرابات استقلالية وشيخوخة مبكرة خطيرة مع القابلية للإصابة بالسرطان. تقدم الوثيقة 2 معطيات حول دور البروتين "Lamine A" في حالة العاديه وفي حالة الإصابة بداء "Progeria".



2. بالاعتماد على الوثيقة 2، قارن(ي) معطيات الشخص السليم بمعطيات الشخص المريض، ثم بين(ي) العلاقة ببروتين صفه. (1.5 ن)

بيّنت الدراسات أن داء "Progeria" يرتبط بمورثة تسمى LMNA. توجد هذه المورثة في شكل حللين: حليل  $LMNA^+$  يتحكم في تركيب البروتين العادي وحليل  $LMNA^-$  يتحكم في تركيب البروتين غير العادي. يقدم الشكل (أ) من الوثيقة 3 جزءاً من اللولب القابل للنسخ للحليل  $LMNA^+$  عند شخص سليم وجزءاً من اللولب القابل للنسخ للحليل  $LMNA^-$  عند شخص مصاب بداء "Progeria". يقدم الشكل (ب) من نفس الوثيقة مستخلصاً من جدول الرمز الوراثي.

رقم الثلاثيات :

جزء الحليل  $LMNA^+$  عند شخص سليم :جزء الحليل  $LMNA^-$  عند شخص مريض:

من حنى القراءة →

الشكل (أ)

الوحدات الرمزية	الأحماض الأمينية										
UUG	UAG	CCC	GAG	AAA	AGA	AGU	GUU	GCC	GGA	CAA	الوحدات الرمزية
CUA	UGA	CCA	GAA	AAG	AGG	AGC	GUG	GCA	GGG	CAG	الأحماض الأمينية
CUU											Leu
Leu											

الشكل (ب)

الوثيقة 3

3. بالاعتماد على معطيات الوثيقة 3، حدد (ي) متالية ARNm وسلسلة عديد الببتيد عند كل من الشخص المريض والشخص السليم، ثم بين(ي) العلاقة مورثة - بروتين. (1.5 ن)

## ❖ المعطى الثالث:

في محاولة للبحث عن علاج لداء "Progeria" تم حديثاً إجراء دراسات تعتمد تقنيات الهندسة الوراثية على فرزان تعاني من نفس أعراض هذا الداء. تستعمل هذه الدراسات علاجاً جينياً يتمثل في حقن متالية نوكليوتيدات ARN "مضاد المعنى" لها القدرة على الارتباط بشكل متكملاً مع ARNm الرامز للبروتين غير العادي. تقدم الوثيقة 4 مبدأ العلاج المستعمل.


متالية نوكليوتيدات ARN

مضاد المعنى

بروتين

ترجمة

أحماض أمينية



الوثيقة 4

## 4. باعتماد معطيات الوثيقة 4:

- أ. بين(ي) كيف يمكن حقن ARN مضاد المعنى من منع إنتاج البروتين غير العادي المسؤول عن هذا الداء. (0.5 ن)  
 ب. أعط (ي) اقتراحاً يمكن تجربتها من التغيير الوراثي للخلايا المريضة بجعلها قادرة على إنتاج ARN مضاد المعنى بشكل مستمر. (0.5 ن)


## التمرین الثالث (4 نقط)

في إطار دراسة انتقال الصفات الوراثية عند ثنيات الصبغة الصبغية وتتأثر بعض عوامل التغير الوراثي على البنية الوراثية للساكنة، نقترح دراسة المعطيات الآتية المتعلقة بحلزون *Cepaea nemoralis*.

❖ المعطى الأول: تظهر دراسة قواعد حلزون *Cepaea nemoralis* تنوعاً كبيراً

بين الأفراد فيما يخص صفتين وراثيتين: لون القوقة وجود أو غياب أشرطة على القوقة. نهتم بدراسة انتقال زوجين من الحلبيات:

- بالنسبة للون القوقة: الحلبي المسؤول عن اللون الوردي والحلبي المسؤول عن اللون الأصفر.



- بالنسبة للأشرطة على القوقة: الحلبي المسؤول عن وجود الأشرطة والحلبي المسؤول عن غياب الأشرطة.  
 التزاوج الأول: بين سلالتين نقيتين  $P_1$  و  $P_2$  (الآباء): السلالة  $P_1$  ذات قواعة وردية بأشرطة والسلالة  $P_2$  ذات قواعة صفراء بدون أشرطة. أعطى هذا التزاوج جيلاً أول  $(F_1)$  كل أفراده بقواعة وردية بدون أشرطة.


التزاوج الثاني: بين أفراد من الجيل  $F_1$  وأفراد بقواعة صفراء بأشرطة. النتائج المحصلة موزعة كما يلي:  
 246 فرداً بقواعة وردية بأشرطة ■ 234 فرداً بقواعة صفراء بدون أشرطة ■

▪ 66 فردا بقوعة صفراء بأشرطة

1. بالاعتماد على نتائج التراوجين الأول والثاني، حدد(ي) معلماً(معلمة) إجابتك :

أ. الحليل السادس والحادي المتنحي؛ (0.5 ن)

ب. هل المورثتان المدرستان مستقلتان أم مرتبتان. (0.5 ن)



2. أعط(ي) التفسير الصبغي لنتائج التراوجين الأول والثاني (1.5 ن)

نستعمل الرموز التالية:

- الرمزين R و r بالنسبة لحملي المورثة المسؤولة عن لون القوقة ؛

- الرمزين B و b بالنسبة لحملي المورثة المسؤولة عن أشرطة القوقة.

❖ المعطى الثاني: يعيش حلزون *Cepaea nemoralis* في أوساط متعددة من بينها الغابات والمروج. يتكون وسط عشه في الغابات أساساً من بساط من الأوراق الميتة تجعل الوسط متجانساً ومظلماً نسبياً. أما في المروج، حيث توجد أعشاب مختلفة الطول، فيكون الوسط غير متجانس الظل. يتغذى طائر السمنة على هذا النوع من الحلزون حيث يكسر القواع بضربيها على الصخور. تمكّن دراسة بقايا القواع، في كل من الوسط الغابوي والمروج، من تحديد المظهر الخارجي الأكثر عرضة للافتراض. تقدم الوثيقة 1 نتائج هذه الدراسة.

3. قارن(ي) بين النتائج المحصلة في الوسطين. (0.5 ن)

4. حدد(ي) عامل التغير المسؤول عن الاختلاف الملاحظ في الوسطين ثم فسر(ي) كيفية تأثيره على ساكنة الحلزون في كل وسط. (1 ن)


#### التمرين الرابع (3 نقط)

تلعب الكريات الملمفاوية دوراً أساسياً في الاستجابة المناعية النوعية. لأجل دراسة بعض أدوار هذه الخلايا

نقدم المعطيات الآتية:

❖ المعطى الأول: في بعض الحالات، مثل السيدا، يحدث خلل في وظيفة هذه الخلايا تترتب عنه عواقب خطيرة على الاستجابة المناعية. تقدم الوثيقة 1 تطور عدد الملمفاويات T4 وعدد فيروسات VIH في الدم عند شخص بعد إصابته

بفيروس VIH.



1. باعتمادك على معطيات الوثيقة 1، ص(ي) تطور عدد فيروسات VIH وعدد الملمفاويات T4 بين الأسبوع السادس والأسبوع الثاني عشر من جهة و خلال مرحلة السيدا من جهة أخرى، ثم فسر(ي) تطور عدد فيروسات VIH خلال هاتين المرحلتين. (1 ن)

## ❖ المعطى الثاني:

لإبراز دور المفاويات T4 في الاستجابة المناعية النوعية أجرت تجربة على ست مجموعات من الفئران:

- المجموعة 1 لم تخضع لأية معالجة.
- المجموعات من 2 إلى 6 خضعت لمعالجة مكنت من حذف صنف أو عدة أصناف من المفاويات.
- حققت المجموعات السبعة بفيروس الزكام.
- بعد ذلك تم قياس فعالية الاستجابة المناعية بتحديد المدة الزمنية اللازمة للقضاء على الفيروس ونسبة الفئران التي بقيت حية في كل مجموعة. يقدم جدول الوثيقة 2 الظروف التجريبية والنتائج المحسّلة.


نسبة الفئران التي بقيت حية (%)	المدة اللازمة للقضاء على الفيروس (بالأيام)	الظروف التجريبية			الجموعات
		B	T4	T8	
100	من 7 إلى 10	+	+	+	المجموعة 1
100	10 إلى 14	+	+	-	المجموعة 2
0	20 <	-	+	-	المجموعة 3
0	20 <	+	-	-	المجموعة 4
50	من 10 إلى 14	-	+	+	المجموعة 5
0	20 <	-	-	-	المجموعة 6

+: وجود المفاويات -: غياب المفاويات

الوثيقة 2

2. باستثمار معطيات الوثيقة 2، حدد(ي) الشرط الضروري لحدوث استجابة مناعية فعالة. علل(ي) إجابتك. (0.5 ن)

يؤدي وضع المفاويات T4 في وسط زرع ملائم به مواد محفزة تلعب دور مولد مضاد، إلى تنشيط هذه المفاويات وإفرازها لمادة الأنترلوكين 2. تبين الوثيقة 3 تأثير تركيز الأنترلوكين 2 على عدد البلازميات المنتجة لمضادات الأجسام. وتبيّن الوثيقة 4 عدد المفاويات T8 في الطحال عند فئران عادية وفئران طافرة تتميز بنقص في إنتاج الأنترلوكين 2، وذلك قبل حقنها بفيروس "La chorioméningite" وبعد مرور 7 أيام عن هذا الحقن.



3. ص(ي) النتائج المبينة في الوثائقين 3 و4 ثم استنتج (ي) أهمية الأنترلوكين 2 في الاستجابة المناعية النوعية. (0.75 ن)

4. أنجز(ي) خطاطة توضح دور المفاويات T4 في الاستجابة المناعية النوعية. (0.75 ن)



-----§§-----